

Вид: Люцерна мінлива *Medicago x varia* Martyn

Заявка № 23364001 Назва сорту: Венера **Заявник (код):** 1591 **Володілець патенту (код):** 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.05.2024 **Патент №** 240195

Дата пріоритету: 09.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	прямий	1	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	висока	7	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	середня частота	5	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	ознака не визначалась	0	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	ознака не визначалась	0	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 2	2	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	ознака не визначалась	0	
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14 %), т/га – 0,4. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 6,56. Вміст білка, % – 17,8; клітковини, % – 32. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev f. *medicaginis* Dietr.) – 8; пероноспороз (*Peronospora aestivalis* Sydow.) – 7; іржа (*Uromyces striatus* Schroter (II і III)) – 8; чорна плямистість стебел – 8; аскохітоз – 7; бура плямистість – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.