

**Вид:** Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraudontia* Filov

**Заявка № 24148001 Назва сорту:** Вуйко **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236

**Володілець патенту (код):** 3236

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 23.05.2024 **Патент № 240210**

**Дата пріоритету:** 12.01.2024

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.05.2024

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 240351**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №    | Ознака   | Проявлення                | Код | Примітка |
|------|--|---------------------------|-----|----------|
| 1    | Паросток: форма сім'ядолей   | широкоеліптична           | 3   |          |
| 2    | Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей  | помірна                   | 5   |          |
| 3    | Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі   | випукла                   | 3   |          |
| 4    | Рослина: габітус   | кущовий                   | 1   |          |
| 5    | Рослина: галуження   | наявне                    | 9   |          |
| 6    | Рослина: ступінь галуження   | слабкий                   | 3   |          |
| 7    | Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)                        | напівпряме                | 3   |          |
| 8    | Стебло: забарвлення  | цілком зелене             | 1   |          |
| 9    | Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення   | слабка                    | 3   |          |
| 10   | Стебло: крапчастість   | відсутня                  | 1   |          |
| 11   | Стебло: вусики   | відсутні або рудиментарні | 1   |          |
| 12   | Листкова пластинка: розмір   | малий                     | 3   |          |
| 13   | Листкова пластинка: розсіченість   | мілка                     | 3   |          |
| 14   | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку  | сильна                    | 7   |          |
| 15   | Листкова пластинка: срібляста плямистість  | відсутня                  | 1   |          |
| 16   | Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю  | мала                      | 3   |          |
| 17   | Черешок: за довжиною   | середній                  | 5   |          |
| 18   | Черешок: кількість шипів   | мала                      | 3   |          |
| 19   | Жіноча квітка: кільце всередині віночка  | наявне                    | 9   |          |
| 20   | Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка  | жовте                     | 1   |          |
| 21   | Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення           | ознака не визначається    | 0   |          |
| 22   | Чоловіча квітка: кільце всередині віночка  | наявне                    | 9   |          |
| 23   | Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка  | жовте і зелене            | 3   |          |
| 24   | Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення         | слабка                    | 3   |          |
| 25   | Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра                             | ознака не визначається    | 0   |          |
| 26   | Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма                                    | ознака не визначається    | 0   |          |
| 27   | Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)                          | біле                      | 1   |          |
| 28   | Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)    | ознака не визначається    | 0   |          |
| 29   | Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27) | ознака не визначається    | 0   |          |
| 30   | Плід: переважаюча форма  | циліндрична               | 9   |          |
| 31,1 | Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною   | ознака не визначається    | 0   |          |
| 31,2 | Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною  | ознака не визначається    | 0   |          |
| 31,3 | Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною  | середній                  | 5   |          |
| 31,4 | Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною  | ознака не визначається    | 0   |          |
| 32,1 | Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр  | ознака не визначається    | 0   |          |
| 32,2 | Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр   | ознака не визначається    | 0   |          |
| 32,3 | Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр   | ознака не визначається    | 0   |          |
| 33,1 | Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра                                      | ознака не визначається    | 0   |          |
| 33,2 | Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра                                       | ознака не визначається    | 0   |          |
| 33,3 | Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра                                       | ознака не визначається    | 0   |          |
| 34,1 | Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір   | ознака не визначається    | 0   |          |
| 34,2 | Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір  | ознака не визначається    | 0   |          |
| 35   | Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки   | ознака не визначається    | 0   |          |
| 36   | Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю  | ознака не визначається    | 0   |          |
| 37   | Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю  | ознака не визначається    | 0   |          |
| 38   | Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки  | ознака не визначається    | 0   |          |
| 39   | Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки  | ознака не визначається    | 0   |          |
| 40   | Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра   | ознака не визначається    | 0   |          |
| 41   | Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки   | ознака не визначається    | 0   |          |
| 42   | Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною  | середня                   | 5   |          |
| 43   | Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра                              | середнє                   | 5   |          |
| 44   | Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки  | відсутнє                  | 1   |          |
| 45   | Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець   | ознака не визначається    | 0   |          |
| 46   | Плід: боріздки   | відсутні                  | 1   |          |
| 47   | Плід: боріздки за глибиною   | ознака не визначається    | 0   |          |
| 48   | Плід: ребра  | наявні                    | 9   |          |
| 49   | Плід: ступінь виявлення ребер  | слабкий                   | 3   |          |
| 50   | Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)                      | біле                      | 1   |          |
| 51   | Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)            | ознака не визначається    | 0   |          |
| 52   | Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)          | ознака не визначається    | 0   |          |

| №  | Ознака  | Проявлення             | Код | Примітка |
|----|---|------------------------|-----|----------|
| 53 | Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення             | ознака не визначається | 0   |          |
| 54 | Плід: смужки на боріздках   | відсутні               | 1   |          |
| 55 | Плід: забарвлення смужок на боріздках   | ознака не визначається | 0   |          |
| 56 | Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)                     | однакове               | 1   |          |
| 57 | Плід: плямистість   | відсутня               | 1   |          |
| 58 | Плід: розмір основних плям  | ознака не визначається | 0   |          |
| 59 | Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)                                 | відсутнє               | 1   |          |
| 60 | Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами                                     | ознака не визначається | 0   |          |
| 61 | Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами   | ознака не визначається | 0   |          |
| 62 | Плід: бородавки на шкірці   | відсутні               | 1   |          |
| 63 | Плід: кількість бородавок на шкірці   | ознака не визначається | 0   |          |
| 64 | Плід: розмір квіткового рубця   | дуже малий             | 1   |          |
| 65 | Плід: плодоніжка за довжиною  | дуже коротка           | 1   |          |
| 66 | Плід: забарвлення плодоніжки  | зелене                 | 2   |          |
| 67 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки   | слабка                 | 3   |          |
| 68 | Плід: крапчастість плодоніжки   | відсутня               | 1   |          |
| 69 | Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок) | біле                   | 1   |          |
| 70 | Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)               | ознака не визначається | 0   |          |
| 71 | Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)   | білувате               | 1   |          |
| 72 | Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)  | відсутній              | 1   |          |
| 73 | Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)   | слабкий                | 3   |          |
| 74 | Стиглий плід: забарвлення м'якоті   | кремове                | 1   |          |
| 75 | Стиглий плід: здерев'яніння шкірки  | відсутнє               | 1   |          |
| 76 | Стиглий плід: структура м'якоті   | не волокниста          | 1   |          |
| 77 | Насінина: розмір  | середній               | 5   |          |
| 78 | Насінина: форма   | вузькоеліптична        | 3   |          |
| 79 | Насінина: лушпиння  | наявне                 | 9   |          |
| 80 | Насінина: наявне лушпиння   | рудиментарне           | 1   |          |
| 81 | Насінина: забарвлення   | білувате               | 1   |          |

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 63. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, днів – 45. Товарність, % – 90. Вміст сухої речовини, % – 5,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 6; бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 6; фузаріозне в'янення (*Fusarium nivae* E.Sm.) – 6; вірусні хвороби – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.**