

**Вид:** Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

**Заявка № 23096007 Назва сорту:** Амагер 611 **Заявник (код):** 3238 **Підтримувач сорту (код):** 3238

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.05.2024

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 240349**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	до великого
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	середнє	5	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	пряме	1	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	широкоюяцеподібна	2	до поперечношироко-еліптичної
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	до плаского
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутній або дуже слабкий	1	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	великий	7	до малого
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	до зеленого
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	відсутня або дуже слабкий	1	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно-еліптична	2	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	рівна	2	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	до великого
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	ближче до основи	3	до середини
22	Головка: ступінь покриття	частково покритий	2	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	слабка	3	до помірної
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
28	Головка: внутрішнє забарвлення	зеленувате	3	до білуватого
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	середня	5	
31	Головка: внутрішня структура	середня	5	до тонкої
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стойкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	наявна	9	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 81. Період від сівби до початку досягання, днів – 150. Лежкість, балів (1–9) – 8. Вміст вітаміну С, мг % – 40; загального цукру, % – 4,1; сухої речовини, % – 7,9. Стойкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 8; бактеріоз судинний – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.