

Вид: Боби кормові *Vicia faba* L. var. *major* Harz

Заявка № 24175001 Назва сорту: Суперагуадульче **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.06.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240392

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|----------------------------|-----|----------|
| 1 | Насіння: танін | ознака не визначалась | 0 | |
| 2 | Рослина: за типом росту | індетермінантна | 2 | |
| 3 | Рослина: за висотою | середня | 5 | |
| 4 | Рослина: кількість стебел (включно пагони, що перевищують більше, ніж на половину головне стебло) | декілька | 3 | |
| 5 | Стебло: кількість вузлів, перший квітковий вузол включно | середня кількість | 5 | |
| 6 | Стебло: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 | |
| 7 | Листя: сіруватий відтінок зеленого кольору | наявний | 9 | |
| 8 | Листя: інтенсивність зеленого кольору | помірний | 5 | |
| 9 | Листкова пластинка: за довжиною (базальна пара пластинки вторинного вузла) | середня | 5 | |
| 10 | Листкова пластинка: за шириною (як для 9) | середня | 5 | |
| 11 | Листкова пластинка: положення найширшого місця | посередині | 2 | |
| 12 | Листкова пластинка: згин (уздовж центральної жилки, верхівкова пара листових пластинок) | слабкий | 3 | |
| 13 | Суцвіття: кількість квіток | середня кількість | 5 | |
| 14 | Час цвітіння (50% рослин зі щонайменше однією квіткою) | середній | 5 | |
| 15 | Квітка: за довжиною | середня | 5 | |
| 16 | Весло: меланінова пляма | відсутня | 1 | |
| 17 | Весло: колір меланінової плями | ознака не визначалась | 0 | |
| 18 | Парус: меланінова пляма | відсутня | 1 | |
| 19 | Парус: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 | |
| 20 | Парус: зона антоціанового забарвлення | мала | 3 | |
| 21 | Китиця: кількість бобів | декілька | 3 | |
| 22 | Біб: положення | пряме | 1 | |
| 23 | Біб: за довжиною (без носика) | довгий | 7 | |
| 24 | Біб: за шириною (від шва до шва) | середній | 5 | |
| 25 | Біб: ступінь викривлення у стадії зелених стулок | відсутній або дуже слабкий | 1 | |
| 26 | Біб: інтенсивність зеленого кольору | помірний | 5 | |
| 27 | Біб: кількість насінних зачатків (включно насіння) | середня кількість | 5 | |
| 28 | Біб: товщина стулок | середні | 5 | |
| 29 | Сухе насіння: форма у поздовжньому розрізі | еліптична | 2 | |
| 30 | Сухе насіння: форма у поперечному розрізі | еліптична | 2 | |
| 31 | Сухе насіння: маса | велика | 7 | |
| 32 | Сухе насіння: колір оболонки (зразу ж після збирання) | зелений | 2 | |
| 33 | Сухе насіння: чорна пігментація рубчика | наявна | 9 | |
| 34 | Час повного розвитку бобу (перші повністю розвинені боби) | середній | 5 | |
| 35 | Вміст віцину/конвіцину | ознака не визначалась | 0 | |

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зелених бобів, т/га – 3. Вміст білка, % – 33,8; вітаміну С, мг/100 г – 1,5; загального цукру, % – 5,8. Група стиглості: середня – 2. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8; вилягання, бал (1–9) – 8; обсипання, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacterium phaseoli* E.F.Sm.) – 6; фузаріоз (*Fusarium oxysporum* Sch.) – 6; аскохітоз (*Ascochyta viciae* Libert.) – 6; шоколадна плямистість (*Botrytis fabae* Sard) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бобова зернівка (*Bruchus rufimanus* Boh.) – 6; бобова (акацієва) вогнівка (*Etiella zinckenella* Tr.) – 7; бобовий стеблоїд (*Lixus algirus* L.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.