

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraultmontia* Filov

Заявка № 23148006 Назва сорту: Грибовський 37 **Заявник (код):** 3238 **Підтримувач сорту (код):** 3238

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.06.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240389

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	широкоеліптична	3	до еліптичної
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	сильна	7	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	випукла	3	
4	Рослина: габітус	кущовий	1	
5	Рослина: галуження	наявне	9	
6	Рослина: ступінь галуження	помірний	5	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	від прямого до напівпрямого	2	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1	
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1	до розвинених
12	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість	мілка	3	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	наявна	9	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	мала	3	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: кількість шипів	середня	5	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	відсутнє	1	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	ознака не визначається	0	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	ознака не визначається	0	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	ознака не визначається	0	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	біле	1	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
30	Плід: переважаюча форма	циліндрична	9	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	ознака не визначається	0	
46	Плід: боріздки	відсутні	1	
47	Плід: боріздки за глибиною	ознака не визначається	0	
48	Плід: ребра	наявні	9	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	помірний	5	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	кремове	2	до білого
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Плід: смужки на боріздках	відсутні	1	
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	ознака не визначається	0	
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	однакове	1	
57	Плід: плямистість	відсутня	1	
58	Плід: розмір основних плям	ознака не визначається	0	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	помірна	5	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	відсутня	1	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	білувате	2	до білого
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначається	0	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	зелене	5	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	наявний	9	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	помірний	5	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1	
77	Насінина: розмір	середній	5	
78	Насінина: форма	еліптична	5	
79	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2	
81	Насінина: забарвлення	кремове	2	до білуватого

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 63. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, днів – 45. Товарність, % – 95. Вміст сухої речовини, % – 5,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 8; бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 8; фузаріозне в'янення (*Fusarium nivae* E.Sm.) – 8; вірусні хвороби – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.