

Вид: Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch.**Заявка № 24294002 Назва сорту:** Зенга Зенгана **Заявник (код):** 2516 **Підтримувач сорту (код):** 2516**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 27.06.2024**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|------------------------------------|-----|-------------|
| 1 | Рослина: габітус | напівпрямий | 2 | |
| 2 | Рослина: щільність розміщення листків | щільна | 7 | |
| 3 | Рослина: сила росту | сильна | 7 | |
| 4 | Рослина: положення суцвіття відносно листків | на одному рівні | 2 | |
| 5 | Рослина: кількість вусів | мала | 3 | |
| 6 | Вуса: антоціанове забарвлення | слабке | 3 | |
| 7 | Вуса: щільність опушенні | середня | 5 | |
| 8 | Листок: розмір | середній | 5 | |
| 9 | Листок: забарвлення верхнього боку | темно-зелене | 4 | |
| 10 | Листок: пухирчастість | відсутня або слабка | 1 | |
| 11 | Листок: глянсуватість | відсутня або слабка | 1 | |
| 12 | Листок: строкатість | відсутня | 1 | |
| 13 | Верхівковий листочок: довжина відносно ширини | однакова | 2 | |
| 14 | Верхівковий листочок: форма основи | тупа | 2 | |
| 15 | Верхівковий листочок: форма краю | від зубчастої до городчастої | 2 | |
| 16 | Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу | увігнута | 1 | |
| 17 | Черешок: за довжиною | середній | 5 | |
| 18 | Черешок: положення волосків | горизонтальне | 3 | |
| 19 | Прилисток: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 20 | Суцвіття: кількість квіток | середня | 5 | |
| 21 | Квітконіжка: положення волосків | горизонтальне | 3 | |
| 22 | Квітка: діаметр | середній | 5 | |
| 23 | Квітка: розташування пелюсток віночка | торкаються | 2 | |
| 24 | Квітка: розмір чащечки відносно віночка | менший | 1 | |
| 25 | Квітка: тичинки | відсутні | 1 | |
| 26 | Пелюстка: довжина відносно ширини | однакова | 3 | |
| 27 | Пелюстка: забарвлення верхнього боку | біле | 2 | |
| 28 | Плід: довжина відносно ширини | довша | 4 | |
| 29 | Плід: розмір | середній | 5 | |
| 30 | Плід: форма | конічна | 2 | |
| 31 | Плід: різниця форми між верхівковими та іншими плодами | мала | 3 | |
| 32 | Плід: забарвлення | темно-червоне | 6 | |
| 33 | Плід: рівномірність забарвлення | рівномірний або ледь нерівномірний | 1 | |
| 34 | Плід: глянсуватість | помірна | 2 | |
| 35 | Плід: нерівність поверхні | відсутня або слабко виражена | 1 | |
| 36 | Плід: ширина вільної від сім'янок зони | відсутня або дуже вузька | 1 | |
| 37 | Плід: положення сім'янок | загиблене | 1 | |
| 38 | Плід: положення чащечки | на рівні плоду | 2 | |
| 39 | Плід: положення чашолистків | донизу | 3 | |
| 40 | Плід: діаметр чащечки порівняно з діаметром плоду | дещо менший | 2 | |
| 41 | Плід: прилягання чащечки до плоду | помірне | 5 | |
| 42 | Плід: твердість | помірна | 5 | |
| 43 | Плід: забарвлення м'якоті (за винятком серцевини) | темно-червоне | 6 | |
| 44 | Плід: забарвлення серцевини | червоне | 3 | |
| 45 | Плід: повітряна комірка | відсутня або дуже мала | 1 | |
| 46 | Час початку цвітіння | середній | 5 | до пізнього |
| 47 | Час початку достигання плодів | середній | 5 | до пізнього |
| 48 | Тип плодоношення | неремонтантний | 1 | |

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 22,0. Середня маса ягоди, г – 12,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 23,51; загального цукру, % – 6,3; пектинових речовин, % – 0,7; сухих розчинних речовин, % – 9,2; фенольних сполук, мг/100 г сирої маси – 141,0. Загальна кислотність, % – 1,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Sphaerotheca fragariae* Magn. f. Jacz) – 8; бура плямистість (*Marssonina potentillae* (Desm.) P. Magn. f. *fragariae* (Lib.) Ohl.) – 7; біла плямистість (*Ramularia tulasnei* Sacc.) – 7. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): малиново-сунничний довгоносик (*Anthophonus rubi* Hrbst.) – 7; сунничний кліщ (*Tarsonemus fragariae* Zimm.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Стійкість квіток до пізньо-весняних заморозків, бал (1–9) – 7. Ремонтантність: відсутня – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Група достигання: середньопізня – 5. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 6. Схема садіння, м – 1,0 x 0,35; 1,5 x (0,35 x 0,30). Загальна дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.