

Вид: Нут звичайний *Cicer arietinum* L.

Заявка № 23028001 Назва сорту: Дарія **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

Володілець патенту (код): 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.07.2024 **Патент №** 240236

Дата пріоритету: 09.01.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.07.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240408

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Рослина: габітус (після цвітіння) | напівпрямий | 3 | |
| 2 | Рослина: галуження | помірне | 5 | |
| 3 | Рослина: за висотою (за повного розвитку бобів) | середня | 5 | |
| 4 | Стебло: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 | |
| 5 | Листки: інтенсивність зеленого забарвлення | слабка | 3 | |
| 6 | Листочок: розмір | середній | 5 | |
| 7 | Квітка: забарвлення | біле | 1 | |
| 8 | Біб: плодоніжка за довжиною | середня | 5 | |
| 9 | Біб: розмір | великий | 7 | |
| 10 | Біб: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 11 | Біб: дзьобик за довжиною | довгий | 7 | |
| 12 | Біб: кількість насінин | одна або дві | 2 | |
| 13 | Насінина: забарвлення (через місяць після збирання) | жовтувато-коричневе | 3 | |
| 14 | Насінина: інтенсивність забарвлення (як для озн. 13) | помірна | 5 | |
| 15 | Насіння: маса | дуже велика | 9 | |
| 16 | Насінина: форма | від кулястої до кутастої | 2 | |
| 17 | Насінина: ребристість | помірна | 5 | |
| 18 | Час цвітіння (80% рослин із щонайменше однією квіткою) | середній | 5 | |
| 19 | Час досягання насіння | середній | 5 | |

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,8. Тривалість періоду вегетації, днів – 85. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 24. Вміст білка, % – 27. Висота рослин, см – 65. Маса 1000 зерен, г – 400. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9; до обсипання – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз – 7; кореневі гнилі – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): зернівка – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.