

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009129 **Назва сорту:** КВС АРТЕЗІО **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649**Дата пріоритету:** 06.12.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.04.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240261**Орган, що провів випробування:** Bundesamt fur Ernahrungssicherheit, AT**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	від помірного до сильного	6	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	від малого до середнього	4	
5	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
6	Волоть: час цвітіння	середній	5	
7	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
8	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення піляків	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
11	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
12	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
13	Качан: час появи шовку	середній	5	
14	Качан: антоціанове забарвлення шовку	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
15	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
16	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
17	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Стебло: антоціанове забарвлення міжузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	від середньої до довгої	6	
20	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
21	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
22,2	Лише для гібридів 1 сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлускним типом зернівки. Рослина: за довжиною	від середньої до довгої	6	
23	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	від середнього до великого	6	
24	Листок: пластинка за ширину	широка	7	
25	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
26	Качан: за довжиною	від середнього до довгого	6	
27	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
28	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
29	Качан: кількість зернових рядів	від малої до середньої	4	
34	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
36	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
37	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
39	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Показники господарської придатності за інформацією, наданою заявником

№ п/п	Показник	Значення
1	ФАО	270
2	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14 %), т/га	14
6	Висота рослини, см	230
12	Стійкість до посухи, бал (1–9)	9
14	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	90
16	Вихід зерна, %	95
17	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка (<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	7
18	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка (<i>Ustilago Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel.)	9
19	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Russinia maydis</i> Ber.)	7
22	Вміст крохмалю, %	70
26	Вміст білка, %	9
28	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспоріоз	9
29	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	7
30	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (<i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenb. et Reinking)	9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.