

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 23009106 **Назва сорту:** ЛГ31276 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 15.01.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240037**Орган, що провів випробування:** Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, CZ**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	від слабкого до помірного	4	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	від малого до середнього	4	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пилляків	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	від малого до середнього	4	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	від відсутнього або дуже малої до малої	2	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	від нещільного до середньої щільності	4	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	від довгої до дуже довгої	8	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	від довгої до дуже довгої	8	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	від середньої до довгої	6	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлускним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: ступінь висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	від середнього до великого	6	
26	Листок: пластинка за ширину	від середньої до широкої	6	
27	Качан: ніжка за довжиною	від короткої до середньої	4	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	від великого до дуже великого	8	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	від слабкого до помірного	4	

Показники господарської придатності за інформацією, наданою заявником

№ п/п	Показник	Значення
1	ФАО	280
2	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14 %), т/га	102,4
6	Висота рослини, см	268,8
12	Стійкість до посухи, бал (1–9)	9
14	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	123,4
16	Вихід зерна, %	83
17	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка (<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	8
18	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка (<i>Ustilago Ustilago maydis</i> (Persoon) Roussel.)	7
19	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Puccinia maydis</i> Ber.)	8
22	Вміст крохмалю, %	71,1
26	Вміст білка, %	9,1
28	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспоріоз	8
29	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	6
30	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (<i>Fusarium moniliiforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenb. et Reinking)	9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.