

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 22040034 Назва сорту: Тріпл Заявник (код): 912 Власник сорту (код): 912

Дата пріоритету: 30.04.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 23.08.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240493

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	до довгих
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	до середнього
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	до середньої
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	до високої
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	до довгої
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	до довгого
19	Стручок: носик за довжиною	довгий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,73	3,44	3,10
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,88	3,11	3,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,15	-0,33	0,31
+, - до усередненої урожайності, %	5,5	-9,6	10,0
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,04	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	295	305	301
Висота рослини, см	142,2	137,8	144,8
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,7	5,1	4,9
Вміст білка, %	18,3	17,2	16,7
Вміст олії, %	47,7	49	49,5
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,2	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,6	0,7
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	6	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	9
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	5
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.