

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка №** 24012033 **Назва сорту:** ЗУ ТАММО **Заявник (код):** 2513 **Власник сорту (код):** 2513**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 26.08.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240508**Орган, що провів випробування:** BUNDESSORTENAMT, Germany**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
2	Зернівка: забарвлення у фенолі	від темного до дуже темного	8	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	від дуже слабкої до слабкої	2	
4	Рослина: габітус (форма куща)	від напівпрямого до напіврозлогого	4	
5	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	від дуже малої до малої	2	
6	Пррапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок середній код 2	помірне	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	від раннього до середнього	4	
8	Пррапорцевий листок: восковий наліт на ліхві	від сильного до дуже сильного	8	
9	Пррапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
10	Колос: восковий наліт	сильний	7	
11	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
12	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
13	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
14	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
15	Колос: за щільністю	нешільний	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	від середнього до дового	6	
17	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
18	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
19	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
20	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
21	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	від слабкого до помірного	4	
22	Нижня колоскова луска. Плече: за ширину (колосок у середині колоса)	від вузького до середнього	4	
23	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	злегка піднесене	7	
24	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
25	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
26	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	від дуже слабкого до середнього	2	
27	Тип розвитку	озимий	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	10,39
2	Висота рослини, см	88
3	Вегетаційний період, діб	268
4	Маса 1000 зерен, г	48,3
5	Зимостійкість, балів (1–9)	7
6	Критична температура вимерзання, °C	-25
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	7
8	Стійкість до посухи, балів (1–9)	7
9	Натуря зерна, г/л	800
10	Вміст білка, %	12,6
11	Вміст сирої клейковини, %	22
12	Показник альвеографа (W), о. а.	225
13	Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	552
14	Напрям використання	зерновий
15	Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі	9
16	Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса	9
17	Стійкість до хвороб, балів (1–9): бура листкова іржа	7
18	Стійкість до хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа	7
19	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	7
20	Стійкість до хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса	7
21	Стійкість до хвороб, балів (1–9): тверда сажка	7
22	Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка	7
23	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові	8
24	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка	7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.