

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 24012032 Назва сорту: ЗУ ХЕННЕР **Заявник (код):** 2513

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.08.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240507

Орган, що провів випробовування: BUNDESSORTENAMT, Germany

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|-----------------------------------|-----|----------|
| 1 | Зернівка: забарвлення | червоне | 2 | |
| 2 | Зернівка: забарвлення у фенолі | від світлого до помірного | 4 | |
| 3 | Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення | сильна | 7 | |
| 4 | Рослина: габітус (форма куща) | напіврозлогий | 5 | |
| 5 | Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком | відсутня або дуже мала | 1 | |
| 6 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 7 | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | середній | 5 | |
| 8 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | від сильного до дуже сильного | 8 | |
| 9 | Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки | від сильного до дуже сильного | 8 | |
| 10 | Колос: восковий наліт | від сильного до дуже сильного | 8 | |
| 11 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | дуже сильний | 9 | |
| 12 | Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні | відсутнє | 1 | |
| 13 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | від низької до середньої | 4 | |
| 14 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом) | слабко виповнена | 3 | |
| 15 | Колос: за щільністю | від нещільного до середнього | 4 | |
| 16 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців) | від середнього до довгого | 6 | |
| 17 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок | наявні зубці | 2 | |
| 18 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною | від дуже коротких до коротких | 2 | |
| 19 | Колос: забарвлення | біле або соломяно-жовте | 1 | біле |
| 20 | Колос: форма (вигляд збоку) | циліндрична | 2 | |
| 21 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла | від слабкого до помірного | 4 | |
| 22 | Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса) | від вузького до середнього | 4 | |
| 23 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою | від прямого до злегка піднесеного | 6 | |
| 24 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною | короткий | 3 | |
| 25 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою | ледь зігнутий | 3 | |
| 26 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні | від слабкого до помірного | 4 | |
| 27 | Тип розвитку | озимий | 1 | |

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

| № з/п | Показник | Значення |
|-------|--|----------|
| 1 | Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | 10,15 |
| 2 | Висота рослини, см | 92 |
| 3 | Вегетаційний період, днів | 269 |
| 4 | Маса 1000 зерен, г | 49,6 |
| 5 | Зимостійкість, балів (1–9) | 7 |
| 6 | Критична температура вимерзання, °C | -20 |
| 7 | Стійкість до вилягання, балів (1–9) | 7 |
| 8 | Стійкість до посухи, балів (1–9) | 7 |
| 9 | Натура зерна, г/л | 782 |
| 10 | Вміст білка, % | 12,8 |
| 11 | Вміст сирової клейковини, % | 22 |
| 12 | Показник альвеографа (W), о. а. | 230 |
| 13 | Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл | 616 |
| 14 | Напрямок використання | зерновий |
| 15 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнілі | 8 |
| 16 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошнеста роса | 9 |
| 17 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): бура листкова іржа | 7 |
| 18 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа | 7 |
| 19 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз | 7 |
| 20 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса | 7 |
| 21 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): тверда сажка | 7 |
| 22 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка | 7 |
| 23 | Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішньостеблові | 7 |
| 24 | Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка | 7 |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.