

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.

Заявка № 23006006 Назва сорту: БЕРІНГ Заявник (код): 2440 Власник сорту (код): 2440

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230927

Орган, що провів випробовування: CREA (Italy)

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Зернівка: забарвлення у фенолі	від світлого до помірного	4	від світло-коричневого до коричневого
2	Колеопиль: антоціанове забарвлення	сильне	7	
3	Рослина: габітус	від прямого до напівпрямого	2	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	дуже мала	2	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	від слабого до помірного	4	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	від слабого до помірного	4	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	до дуже сильного
11	Колос: восковий наліт	від сильного до дуже сильного	8	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	від вузького до середнього	4	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	до довгого
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	слабке	3	до середнього
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	біле	1	
25	Колос: форма	пірамідальна	1	
26	Колос: за щільністю	від помірного до щільного	6	
27	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	короткий	3	
28	Зернівка: форма	середньоподовжена	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	

#### Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8
2	Висота рослини, см	85
3	Тривалість періоду вегетації, діб	193
4	Маса 1000 зерен, г	59
5	Стійкість до вилягання, бал (1–9)	8
6	Стійкість до обсіпання, бал (1–9)	9
7	Стійкість до посухи, бал (1–9)	7
8	Стійкість до проростання в колосі, бал (1–9)	8
9	Натура зерна, г/л	81
10	Вміст білка, %	14
11	Вміст сирової клейковини, %	35
13	- кореневі гнилі ( <i>Leptosphaeria herpotrichoides</i> de Not., <i>Ophiobolus graminis</i> Sacc., <i>O. herpotrichoides</i> (Fr.) Sacc.)	6
14	- борошниста роса ( <i>Erysiphe graminis</i> DS.f. <i>tritici</i> Marchal)	6
15	- бура іржа ( <i>Puccinia triticina</i> Erikss.)	6
16	- стеблова (лінійна) іржа ( <i>Puccinia graminis</i> Pers. f. <i>tritici</i> Erikss. et Henn.)	7
17	- септоріоз ( <i>Septoria tritici</i> Desm., <i>S. nodorum</i> Berk)	6
18	- фузаріоз колоса ( <i>Fusarium graminearum</i> Schw.)	7
19	- тверда сажка ( <i>Tilletia tritici</i> Wint.)	5
20	- летюча сажка ( <i>Ustilago tritici</i> (Pers.) Jens.)	5
22	- внутрішньостеблові	7
23	- клоп-черепашка ( <i>Eurygaster integriceps</i> Put.)	5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.