

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.**Заявка №** 23006004 **Назва сорту:** КАРТЕЗІО **Заявник (код):** 2440 **Власник сорту (код):** 2440**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 20.09.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230656**Орган, що провів випробування:** CREA (Italy)**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Зернівка: забарвлення у фенолі	від світлого до помірного	4	середньо світло-коричневий
2	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	прямий	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	дуже мала	2	
5	Час початку колосиння (перший колосок видно на 50% колосів)	від раннього до середнього	4	
6	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
8	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	слабкий	3	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	від помірного до сильного	8	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	однакова	2	
14	Нижня колоскова луска: за формою	яйцеподібна	3	
15	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	прямe	3	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за ширину	від дуже вузького до вузького	2	
17	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	від середнього до довгого	6	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
19	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
20	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	слабке	3	
21	Остюки: забарвлення	пурпурове	5	
22	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
23	Колос: забарвлення	бліле або солом'яно-жовте	1	
24	Колос: за щільністю	помірний	5	
25	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	короткий	3	
26	Зернівка: форма	середньоподовжена	2	
27	Тип розвитку	ярий	3	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,8-8
2	Висота рослини, см	80
3	Тривалість періоду вегетації, діб	185-190
4	Маса 1000 зерен, г	48-50
5	Стійкість до вилягання, бал (1-9)	7
6	Стійкість до обсипання, бал (1-9)	9
7	Стійкість до посухи, бал (1-9)	7
8	Стійкість до проростання в колосі, бал (1-9)	8
9	Натура зерна, г/л	820-840
10	Вміст білка, %	14,5-15,5
11	Вміст сирої клейковини, %	35
13	- кореневі гнилі (<i>Leptosphaeria herpotrichoides</i> de Not., <i>Ophiobolus graminis</i> Sacc., O. <i>herpotrichoides</i> (Fr.) Sacc.)	6
14	- борошниста роса (<i>Erysiphe graminis</i> DS.f. <i>tritici</i> Marchal)	7
15	- бура іржа (<i>Puccinia triticia</i> Erikss.)	7
16	- стеблова (лінійна) іржа (<i>Puccinia graminis</i> Pers. f. <i>tritici</i> Erikss. et Henn.)	6
17	- септоріоз (<i>Septoria tritici</i> Desm., S <i>nodorum</i> Berk.)	6
18	- фузаріоз колоса (<i>Fusarium graminearum</i> Schw.)	6
19	- тверда сажка (<i>Tilletia tritici</i> Wint.)	5
20	- летюча сажка (<i>Ustilago tritici</i> (Pers.) Jens.)	5
22	- внутрішньостеблові	7
23	- клоп-черепашка (<i>Eurygaster integriceps</i> Put.)	5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.