

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.

Заявка № 23006003 Назва сорту: КЕНОБІ Заявник (код): 2440 Власник сорту (код): 2440

Дата пріоритету: 06.09.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230713

Орган, що провів випробовування: CRA-SCS, Italy

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	від помірного до сильного	6	
3	Рослина: габітус	від прямого до напівпрямого	2	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	помірний	5	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	від помірного до сильного	8	
11	Колос: восковий наліт	від сильного до дуже сильного	8	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	слабке	3	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	від короткого до середнього	4	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	біле	1	
26	Колос: форма	циліндрична	2	
27	Колос: за щільністю	помірний	5	
28	Зернівка: форма	овальна	5	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	короткий	3	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
31	Тип розвитку	ярий	3	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,5
2	Висота рослини, см	85
3	Тривалість періоду вегетації, діб	180
4	Маса 1000 зерен, г	52–55
5	Стійкість до вилягання, бал (1–9)	7
6	Стійкість до обсіпання, бал (1–9)	9
7	Стійкість до посухи, бал (1–9)	7
8	Стійкість до проростання в колосі, бал (1–9)	8
9	Натура зерна, г/л	810–830
10	Вміст білка, %	14–15,5
11	Вміст сирової клейковини, %	35
13	- кореневі гнілі (<i>Leptosphaeria herpotrichoides</i> de Not., <i>Ophiobolus graminis</i> Sacc., <i>O. herpotrichoides</i> (Fr.) Sacc.)	6
14	- борошниста роса (<i>Erysiphe graminis</i> DS.f. <i>tritici</i> Marchal)	7
15	- бура іржа (<i>Puccinia triticina</i> Erikss.)	7
16	- стеблова (лінійна) іржа (<i>Puccinia graminis</i> Pers. f. <i>tritici</i> Erikss. et Henn.)	6
17	- септоріоз (<i>Septoria tritici</i> Desm., <i>S. nodorum</i> Berk)	6
18	- фузаріоз колоса (<i>Fusarium graminearum</i> Schw.)	6
19	- тверда сажка (<i>Tilletia tritici</i> Wint.)	5
20	- летюча сажка (<i>Ustilago tritici</i> (Pers.) Jens.)	5
22	- внутрішньостеблові	7
23	- клоп-черепашка (<i>Eurygaster integriceps</i> Put.)	5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.