

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 23045018 Назва сорту: ПРОЦЕРА 1020 **Заявник (код):** 2788 **Власник сорту (код):** 2788

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 13.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231250

Орган, що провів випробування: ISTIS, Romania (Державний інститут випробування сортів та реєстрації, Румунія)

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	від помірної до сильної	6	
11	Квітка: забарвлення	біле	1	
12	Біб: забарвлення	світло-сіре	4	
13	Насінина: розмір	малий	3	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінневої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
2	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	5,8
3	Вегетаційний період, днів	115
7	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	9
8	Стійкість до обсипання, балів (1–9)	9
9	Стійкість до посухи, балів (1–9)	8
10	Висота прикріплення нижнього бобу, см	10
12	Стійкість до хвороб, балів (1–9): аскохітоз	7
13	Стійкість до хвороб, балів (1–9): переноспороз	8
14	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	8
15	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): бобова вогнівка	8
19	Вміст олії в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	20
23	Вміст білку в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	40
24	Напрямок використання	на зерно

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.