

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 22012044 Назва сорту: Інвіктус **Заявник (код):** 2552 **Власник сорту (код):** 2552

Дата пріоритету: 28.07.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.09.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240539

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 2 | Рослина: габітус (форма куща) | прямий | 1 | |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 4 | Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком | відсутня або дуже мала | 1 | |
| 5 | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | середній | 5 | |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | слабкий | 3 | |
| 7 | Колос: восковий наліт | слабкий | 3 | |
| 8 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | помірний | 5 | |
| 9 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | середня | 5 | |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом) | слабко виповнена | 3 | |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку) | пірамідальна | 1 | |
| 12 | Колос: за щільністю | нешільний | 3 | |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців) | середній | 5 | |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок | наявні остюки | 3 | |
| 15 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною | довгі | 7 | |
| 16 | Колос: забарвлення | біле або солом'яно-жовте | 1 | |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса) | вузьке | 3 | |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою | пряме | 3 | |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною | дуже довгий | 9 | |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою | прямий | 1 | |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні | слабке | 3 | |
| 23 | Нижня квітова луска. Зубець: за формою | ознака не визначається | 0 | |
| 24 | Зернівка: забарвлення | червоне | 2 | |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі | світле | 3 | |
| 26 | Тип розвитку | озимий | 1 | |
| 27 | Зернівка: за довжиною | довга | 7 | |
| 28 | Зернівка: за шириною | широка | 7 | |
| 29 | Зернівка: відношення довжина / ширина | середнє | 5 | |
| 30 | Зернівка: за крупністю | крупна | 7 | |
| 31 | Язичок: виявлення | короткий | 3 | |
| 32 | Нижня квітова луска: кіль | відсутній | 1 | |
| 33 | Вушка: за формою | гострі | 2 | |
| 34 | Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні | слабке | 3 | |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса) | яйцеподібна | 1 | |
| 36 | Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки | слабкий | 3 | |
| 37 | Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні | наявне | 9 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|------|------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 5,50 | 7,07 | 6,34 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | 5,81 | 7,88 | 7,55 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га | 0,31 | 0,81 | 1,21 |
| +, - до усередненої урожайності, % | 5,6 | 11,5 | 19,1 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 258 | 265 | 266 |
| Висота рослини, см | 87,9 | 89,7 | 95,8 |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г | 39,4 | 43,2 | 42,6 |
| Вміст білка, % | 13,9 | 13,4 | 12,4 |
| Вміст сирової клейковини, % | 27,9 | 27,9 | 24,6 |
| Показник альвеографа (W), о.а. | 284,3 | 300 | 223 |
| Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл | 1000 | 845 | 830 |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 7 | 7 |
| Стійкість до обсіпання, бал | 9 | 8 | 9 |
| Стійкість до посухи, бал | 6 | 7 | 7 |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал | 9 | 6 | 7 |
| Стійкість проти бурої іржі, бал | 9 | 7 | 5 |
| Стійкість проти фузаріозу колоса, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти мухи шведської, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти клопа-черепашки, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти летючої сажки, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти твердої сажки, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал | | 8 | |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал | 7 | 8 | 7 |
| Морозостійкість за штучного проморожування, бал | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Блок | 1 | 1 | 1 |
| Напрямок використання | цїн | цїн | ф |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.