

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 22012013 Назва сорту: Київська 20 Заявник (код): 355 Володілець патенту (код): 355

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.09.2024 Патент № 240358

Дата пріоритету: 28.04.2022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|---------------------------|-----|----------|
| 1 | Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 2 | Рослина: габітус (форма куща) | прямий | 1 | |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 4 | Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком | мала | 3 | |
| 5 | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | середній | 5 | |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | помірний | 5 | |
| 7 | Колос: восковий наліт | помірний | 5 | |
| 8 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | помірний | 5 | |
| 9 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | середня | 5 | |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом) | слабко виповнена | 3 | |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку) | піраміdalна | 1 | |
| 12 | Колос: за щільністю | середній | 5 | |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців) | середній | 5 | |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок | наявні зубці | 2 | |
| 15 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною | короткі | 3 | |
| 16 | Колос: забарвлення | блідо або солом'яно-жовте | 1 | |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла | сильне | 7 | |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за ширину (колосок у середині колоса) | середнє | 5 | |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою | пряме | 3 | |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною | короткий | 3 | |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою | ледь зігнутий | 3 | |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні | помірне | 5 | |
| 23 | Нижня квіткова луска. Зубець: за формою | ледь зігнутий | 2 | |
| 24 | Зернівка: забарвлення | червоне | 2 | |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі | відсутнє або дуже світле | 1 | |
| 26 | Тип розвитку | озимий | 1 | |
| 27 | Зернівка: за довжиною | довга | 7 | |
| 28 | Зернівка: за ширину | середня | 5 | |
| 29 | Зернівка: відношення довжина / ширина | середнє | 5 | |
| 30 | Зернівка: за крупністю | середня | 5 | |
| 31 | Язичок: виявлення | довгий | 7 | |
| 32 | Нижня квіткова луска: кіль | відсутній | 1 | |
| 33 | Вушка: за формою | гострі | 2 | |
| 34 | Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні | помірне | 5 | |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса) | овальна | 2 | |
| 36 | Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки | слабкий | 3 | |
| 37 | Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні | наявне | 9 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 5,50 | 7,07 | 6,34 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | 5,71 | 8,20 | 7,67 |
| + - до усередненої урожайності, т/га | 0,21 | 1,13 | 1,33 |
| + - до усередненої урожайності, % | 3,8 | 16,0 | 21,0 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 258 | 261 | 268 |
| Висота рослини, см | 91,5 | 97,4 | 99,1 |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г | 42,4 | 46,8 | 44,2 |
| Вміст білка, % | 13,1 | 12,7 | 12 |
| Вміст сирої клейковини, % | 26,5 | 25,1 | 23,2 |
| Показник альвеографа (W), о.а. | 243 | 254,7 | 244 |
| Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл | 880 | 890 | 960 |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 8 | 7 |
| Стійкість до обсипання, бал | 9 | 9 | 8 |
| Стійкість до посухи, бал | 6 | 8 | 7 |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал | 9 | 8 | 7 |
| Стійкість проти бурої іржі, бал | 8 | 8 | 5 |
| Стійкість проти фузаріозу колоса, бал | 9 | 9 | 8 |
| Стійкість проти мухи шведської, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти клопа-черепашки, бал | 9 | 9 | 8 |
| Стійкість проти летючої сажки, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти твердої сажки, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал | | 8 | |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал | 8 | 6 | 7 |
| Морозостійкість за штучного проморожування, бал | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Блок | 1 | 1 | 1 |
| Напрям використання | Ф | Ф | Ф |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.