

Вид: Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.**Заявка № 22007002 Назва сорту:** Сріблястий **Заявник (код):** 1591 **Володілець патенту (код):** 1591**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 27.09.2024 **Патент №** 240367**Дата пріоритету:** 12.05.2022**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1 | Колеоптиль: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 2 | Перший листок: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 3 | Рослина: габітус | напівпрямий | 3 | |
| 4 | Кількість рослин із згнутим пропорцевим листком | відсутній або дуже мала | 1 | |
| 5 | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | ранній | 3 | |
| 6 | Пропорцевий листок: восковий напіл на піхві | помірний | 5 | |
| 7 | Пропорцевий листок: восковий напіл на листковій пластинці (з нижнього боку) | слабкий | 3 | |
| 8 | Остюки: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 9 | Соломина: опушення верхнього вузла | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 10 | Соломина: восковий напіл на верхньому міжвузлі | помірний | 5 | |
| 11 | Колос: восковий напіл | помірний | 5 | |
| 12 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | середня | 5 | |
| 13 | Колос: наявність і розміщення остюків | по всій довжині колоса | 4 | |
| 14 | Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса | довша | 3 | |
| 15 | Нижня колоскова луска: за формою | видовжена | 5 | |
| 16 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою | округле | 2 | |
| 17 | Нижня колоскова луска. Плече: за ширину | вузьке | 3 | |
| 18 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною | короткий | 3 | |
| 19 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою | ледь згнутий | 2 | |
| 20 | Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні | відсутнє | 1 | |
| 21 | Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом) | помірне | 5 | |
| 22 | Остюки: забарвлення | бліле | 1 | |
| 23 | Колос: за довжиною (без остюків) | короткий | 3 | |
| 24 | Колос: опушення країв нижніх 2 - 4 сегментів стрижня | сильне | 7 | |
| 25 | Колос: інтенсивність забарвлення за досягнання | бліле | 1 | |
| 26 | Колос: форма | піраміdalна | 1 | |
| 27 | Колос: за щільністю | щільний | 7 | |
| 28 | Зернівка: форма | видовжена | 7 | |
| 29 | Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки) | короткий | 3 | |
| 30 | Зернівка: забарвлення у фенолі | відсутнє або дуже світле | 1 | |
| 31 | Тип розвитку | озимий | 1 | |
| 32 | Колос: забарвлення | блілий або солом'яно-жовте | 1 | |
| 33 | Язичок: за формою | округлий | 1 | |
| 34 | Язичок: за довжиною | короткий | 3 | |
| 35 | Вушка: охоплення соломини | з перекриттям | 3 | |
| 36 | Пропорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 37 | Лиші для сортів пшениці двозерної звичайної. Колос: ламкість | ознака не визначається | 0 | |
| 38 | Лиші для сортів пшеници двозерної звичайної. Зернівка: маса 1000 | ознака не визначається | 0 | |
| 39 | Лиші для сортів пшеници двозерної звичайної. Рослина: час досягнання зерна | ознака не визначається | 0 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 5,37 | 5,67 | |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | 5,57 | 7,31 | |
| + - до усередненої урожайності, т/га | 0,20 | 1,64 | |
| + - до усередненої урожайності, % | 3,7 | 28,9 | |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,38 | 0,24 | |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 259 | 268 | |
| Висота рослини, см | 88,5 | 84 | |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г | 44,1 | 43,3 | |
| Вміст білка, % | 12,3 | 12,7 | |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 7 | |
| Стійкість до обсипання, бал | 9 | 9 | |
| Стійкість до посухи, бал | 7 | 8 | |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал | 9 | 7 | |
| Стійкість проти бурої іржі, бал | 9 | 8 | |
| Стійкість проти фузаріозу колоса, бал | 9 | 9 | |
| Стійкість проти мухи шведської, бал | 0 | 9 | |
| Стійкість проти клопа-черепашки, бал | 9 | 9 | |
| Стійкість проти твердої сажки, бал | 9 | 9 | |
| Стійкість проти летячої сажки, бал | 9 | 9 | |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал | 8 | 8 | |
| Морозостійкість за штучного проморожування, бал | 4,0 | 4,0 | |
| Блок | 1 | 1 | |
| Напрям використання | x | x | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.