

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 22022003 Назва сорту: Костюша Носівський **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990

Володілець патенту (код): 1990

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.10.2024 **Патент №** 240375

Дата пріоритету: 08.07.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.09.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240531

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	ознака не визначається	0	
2	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	ранній	3	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	сильна	7	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	сильна	7	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	помірно щільне	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	короткі	3	
17	Нижня колоскова луска: перший кільвий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	короткий	3	
18	Нижня колоскова луска: другий кільвий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалася	0	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	яйцеподібна	3	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричневе	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	деформована	3	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	сильна	7	
38	Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,37	5,60
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		8,04	6,95
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,67	1,35
+, - до усередненої урожайності, %		26,2	24,1
Довірчий інтервал, т/га		0,24	0,15
Тривалість періоду вегетації, дів		276	271
Висота рослини, см		106,1	98,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		54,6	48,2
Череззерниця, %		2,4	5,2
Вміст білка, %		11,1	10,7
Вміст морозобійних зерен, %		0	0,8
Стійкість до вилягання, бал		8	9
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		8	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	7
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	6
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	6
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.