

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.**Заявка № 22019002 Назва сорту:** МІП Янус **Заявник (код):** 2859 **Володілець патенту (код):** 2859**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 24.09.2024 **Патент №** 240350**Дата пріоритету:** 10.01.2022**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітур (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опущення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	велика	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчики	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчики	слабка	3	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	шість	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	відсутній або дуже малий	1	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опущення центральної борідки	наявне	9	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алійронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опущення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	проміжна	5	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	ознака не визначалась	0	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,33	6,72	7,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,71	6,91	6,23
+ - до усередненої урожайності, т/га	0,38	0,19	-0,77
+ - до усередненої урожайності, %	6,0	2,8	-11,0
Довірчий інтервал, т/га	0,26	0,18	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	245	263	254
Висота рослини, см	98,6	100	105,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,3	45,4	40,9
Вміст білка, %	12,1	12,3	10,8
Стийкість до вилягання, бал	6	4	4
Стийкість до обсипання, бал	9	9	8
Стийкість до посухи, бал	7	7	8
Стийкість проти борошнистої роси, бал	9	8	6
Стийкість проти бурої тріжі, бал	9	8	6
Стийкість проти гельмінтоспоріозу, бал	9	7	5
Стийкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал	6	9	8
Блок	1	1	1
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.