

**Вид:** Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

**Заявка № 21101003 Назва сорту:** ГРІНЕРДЖІ **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.10.2024

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 240608**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	висока	7	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5	
4	Листок: положення	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення ширина / довжина	середнє	5	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5	
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
13	Листок: пухирчатість	помірна	5	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	слабка	3	
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1	
17	Головка: за висотою	середня	5	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма позовжнього розрізу	поперечно широко-еліптична	2	
20	За винятком сортів з трикутною головкою. Головка: закручування краю	помірне	5	
21	Головка: забарвлення	зелене	4	
22	Головка: горбкуватість	помірна	5	
23	Головка: текстура	груба	7	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1	
25	Квітка: забарвлення	жовте	2	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	середня	5	
27	Скоростиглість: за літнього садіння	середній осінній тип	5	
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	

**За інформацією, наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 145. Товарна врожайність, т/га – 50. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 95. Період плодоношення, діб – 10. Вміст білка, % – 2; вітаміну С, мг % – 60; загального цукру, % – 5; сухої речовини, % – 10. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5; бактеріоз судинний – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.