

**Вид:** Морква *Daucus carota* L.

**Заявка № 21109004 Назва сорту:** Рубіпринц **Заявник (код):** 753 **Власник сорту (код):** 753

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.10.2024

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 240638**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за ширину	широкая	7	
2	Листок: положення	напівпрямое	3	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	середний	5	
4	Листок: розсіченість	тонкая	3	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9	
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
8	Коренеплід: за ширину	вузький	3	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	велике	7	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	вузькотрикутна	4	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	слабка	3	
12	Коренеплід: форма плеча	плескатая	1	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку).	сильнозагострений	3	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	рожевувато-червоне	4	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	мала	3	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	середня	5	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	середній	5	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	жовте	2	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	слабка	3	
22	Коренеплід: забарвлення флоеми	рожевувато-червоне	4	
23	За винятком сортів із білою флоемою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоеми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоеми	світліше	1	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	помірна	5	
26	Коренеплід: надземна частина	відсутня або дуже мала	1	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	пізній	7	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	сильна	7	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	середній	5	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	велика	3	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові піляки	2	

**За інформацією, наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 20. Тривалість періоду від появи сходів до споживчої стигlosti, діб – 110. Вміст каротину, мг % – 25,6; загального цукру, % – 6,5; сухої речовини, % – 10,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): альтернаріоз – 8; гниль біла – 8; гниль суха – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль мокра бактеріальна – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СПП.