

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 17115015 Назва сорту: Колеос Заявник (код): 2292 Власник сорту (код): 2292

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.04.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190809

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №    | Ознака   | Проявлення               | Код | Примітка |
|------|--|--------------------------|-----|----------|
| 1    | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія  | наявне                   | 9   |          |
| 2    | Рослина: тип розвитку  | індетермінантний         | 2   |          |
| 3    | Лише детермінантні сорти Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)             | ознака не визначається   | 0   |          |
| 4    | Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині  | відсутнє або дуже слабе  | 1   |          |
| 5    | Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям                                   | середнє                  | 5   |          |
| 6    | Листок: положення (у середній третині рослини)   | поникле                  | 9   |          |
| 7    | Листок: за довжиною  | довгий                   | 7   |          |
| 8    | Листок: за шириною   | середній                 | 5   |          |
| 9    | Листок: за розсіченістю  | перистий                 | 1   |          |
| 10   | Листок: розмір листочків (у середній частині листка)   | середній                 | 5   |          |
| 11   | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення   | сильна                   | 7   |          |
| 12   | Листок: глянсуватість (як для б)   | слабка                   | 3   |          |
| 13   | Листок: пухирчастість (як для б)   | помірна                  | 5   |          |
| 14   | Листок: розмір пухирів (як для б)  | малий                    | 3   |          |
| 15   | Листок: положення черешка листочків відносно головної осі  | піднесене                | 3   |          |
| 16   | Суцвіття: за типом   | переважно не галузисте   | 1   |          |
| 17   | Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)  | відсутня                 | 1   |          |
| 18   | Квітка: опушення приймочки маточки   | відсутнє або дуже слабе  | 1   |          |
| 19   | Квітка: забарвлення  | жовте                    | 1   |          |
| 20   | Квітконіжка: відокремлюючий шар  | наявний                  | 9   |          |
| 21   | Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки) | коротка                  | 3   |          |
| 22   | Плід: розмір   | великий                  | 7   |          |
| 23   | Плід: відношення довжини до діаметра   | середнє                  | 5   |          |
| 24   | Плід: форма поздовжнього розрізу   | оберненояцеподібна       | 8   |          |
| 25   | Плід: ребристість біля плодоніжки  | відсутня або дуже слабка | 1   |          |
| 26   | Плід: форма поперечного перерізу   | кругляста                | 2   |          |
| 27   | Плід: заглиблення біля плодоніжки  | відсутнє або дуже мілке  | 1   |          |
| 28   | Плід: розмір рубця плодоніжки  | дуже малий               | 1   |          |
| 29   | Плід: розмір квіткового рубця  | дуже малий               | 1   |          |
| 30   | Плід: форма кінця плоду  | від плескатої до гострої | 4   |          |
| 31   | Плід: розмір серцевини в поперечному перерізі  | середній                 | 5   |          |
| 32   | Плід: перикарпій за товщиною   | середній                 | 5   |          |
| 33   | Плід: кількість насінневих камер   | три-чотири               | 3   |          |
| 34   | Плід: зелене плече (перед досяганням)  | відсутнє                 | 1   |          |
| 35   | Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)  | ознака не визначається   | 0   |          |
| 36   | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)  | ознака не визначається   | 0   |          |
| 37   | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)                                | дуже слабка              | 1   |          |
| 38   | Плід: забарвлення (за досягання)   | червоне                  | 5   |          |
| 39   | Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)   | червоне                  | 5   |          |
| 40   | Плід: за твердістю   | помірний                 | 5   |          |
| 41   | Плід: термін лежкості  | тривалий                 | 7   |          |
| 42   | Час цвітіння   | ранній                   | 3   |          |
| 43   | Час досягання  | ранній                   | 3   |          |
| 44   | Плід: вміст сухої речовини (за досягання)  | середній                 | 5   |          |
| 45   | Наявність сріблястості   | несприятливий            | 1   |          |
| 46   | Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>   | наявна                   | 9   |          |
| 47   | Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>  | наявна                   | 9   |          |
| 48,1 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>  | наявна                   | 9   |          |
| 48,2 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> : Паса 1                                   | ознака не визначалась    | 0   |          |
| 49   | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>                                    | наявна                   | 9   |          |
| 50,1 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )   | відсутня                 | 1   |          |
| 50,2 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи А   | ознака не визначалась    | 0   |          |
| 50,3 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи В   | ознака не визначалась    | 0   |          |
| 50,4 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи С   | ознака не визначалась    | 0   |          |
| 50,5 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи D   | ознака не визначалась    | 0   |          |
| 50,6 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> : Групи Е   | ознака не визначалась    | 0   |          |
| 51,1 | Стійкість проти Tomato Mosaic Virus  | наявна                   | 9   |          |
| 51,2 | Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1   | ознака не визначалась    | 0   |          |
| 51,3 | Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 2   | ознака не визначалась    | 0   |          |
| 51,4 | Стійкість проти Mosaic Virus: Патотипу 1-2   | ознака не визначалась    | 0   |          |
| 52   | Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>  | відсутня                 | 1   |          |
| 53   | Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>  | відсутня                 | 1   |          |
| 54   | Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.  | відсутня                 | 1   |          |
| 55   | Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>  | відсутня                 | 1   |          |
| 56   | Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>  | відсутня                 | 1   |          |
| 57   | Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus  | відсутня                 | 1   |          |
| 58   | Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus  | відсутня                 | 1   |          |

| №  | Ознака   | Проявлення  | Код | Примітка |
|----|--|-------------|-----|----------|
| 59 | Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>          | наявна      | 9   |          |
| 60 | Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>         | відсутня    | 1   |          |
| 61 | Стійкість проти <i>Tomato torrado virus (ToTV)</i> | відсутня    | 1   |          |
| 62 | Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою    | дуже висока | 9   |          |
| 63 | Плід: зелені смуги (перед досяганням)              | відсутні    | 1   |          |
| 64 | Плід: глянуватість шкірки                          | помірна     | 2   |          |
| 65 | Плід: епідерміс                                    | жовтий      | 2   |          |

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 39. Вміст каротину, мг% – 0,6. Вміст сухої речовини в плоді, % – 6,8. Вміст вітаміну С, мг% – 13,3. Вміст загального цукру, % – 3,9. Загальна кислотність, % – 0,42. Маса товарного плоду, г – 140. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 90. Тривалість періоду плодоношення, діб – 86. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): попелиця – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.