

Вид: Просо посівне *Panicum miliaceum* L.

Заявка № 23014001 Назва сорту: Славетне **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Володілець патенту (код): 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.10.2024 **Патент №** 240419

Дата пріоритету: 20.02.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.10.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240625

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Прапорцевий листок: положення листкової пластинки | напівпряме | 3 | |
| 2 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 | |
| 3 | Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 | |
| 4 | Прапорцевий листок: за довжиною | середній | 5 | |
| 5 | Прапорцевий листок: за шириною | середній | 5 | |
| 6 | Стебло: кількість вузлів | мала | 3 | |
| 7 | Стебло: верхнє міжвузля за довжиною | середнє | 5 | |
| 8 | Стебло: міжвузля за товщиною | товсте | 7 | |
| 9 | Час виявлення волоті | середній | 5 | |
| 10 | Рослина: за висотою (стебло та волоть) | висока | 7 | |
| 11 | Волоть: кут відхилення гілочок | помірно гострий | 2 | |
| 12 | Волоть: положення у просторі | сильно похиле | 4 | |
| 13 | Волоть: головна вісь за довжиною (без квітконіжки) | середня | 5 | |
| 14 | Волоть: за шириною | вузька | 3 | |
| 15 | Волоть: за щільністю | нещільна | 3 | |
| 16 | Волоть: ступінь вигину бічних гілочок | сильний | 7 | |
| 17 | Волоть: кількість подушечок | велика | 7 | |
| 18 | Волоть: гілочки першого порядку за довжиною | короткі | 3 | |
| 19 | Колосок: форма | широкоеліптична | 2 | |
| 20 | Колосок: інтенсивність жовтого забарвлення | слабка | 3 | |
| 21 | Колоскова луска: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 22 | Приймочка маточки: забарвлення | світло-рожеве | 1 | |
| 23 | Зернівка: розмір | дуже великий | 9 | |
| 24 | Зернівка: форма | широкоеліптична | 2 | |
| 25 | Зернівка: забарвлення | жовте | 4 | |
| 26 | Зернівка: плямистість | наявна | 9 | |
| 27 | Зернівка: розмір плям | малий | 3 | |
| 28 | Маса 1000 зерен | велика | 7 | |
| 29 | Ядро (не шліфоване): забарвлення | світло-жовте | 2 | |
| 30 | Ядро: інтенсивність коричневого забарвлення насіннєвого рубчика | слабка | 1 | |
| 31 | Ядро: тип ендосперму | не восковий | 2 | |
| 32 | Стійкість проти ураження расами сажки (<i>Sporisorium destruens</i> Yank) | ознака не визначалась | 0 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 3,03 | 3,44 | 2,86 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | 2,96 | 3,95 | 3,13 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га | -0,07 | 0,51 | 0,27 |
| +, - до усередненої урожайності, % | -2,3 | 14,8 | 9,4 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,44 | 0,27 | 0,26 |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 86 | 99 | 92 |
| Висота рослини, см | 97,3 | 114,4 | 126,8 |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г | 7,6 | 7 | 7,8 |
| Вимолочуваність, бал | 9 | 8,8 | 8,2 |
| Вміст білка, % | 14,8 | 12,4 | 11,7 |
| Плівковість, % | 16,8 | 17,3 | 17,6 |
| Вихід крупи, % | 79 | 78,2 | 78,2 |
| Стійкість до вилягання, бал | 7 | 6 | 5 |
| Стійкість до обсипання, бал | 7 | 7 | 7 |
| Стійкість до посухи, бал | 8 | 8 | 7 |
| Стійкість проти бактеріозу плямистого, бал | 9 | 7 | 7 |
| Стійкість проти сажки, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти просяного комарика, бал | 9 | 7 | 7 |
| Напрямок використання | х | х | х |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.