

® 07008003 Крейсер

Заявник:

Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насінництва та сортовищчання Української академії аграрних наук

Тип розвитку - озимий. Кущ - прямостоячий, рослини середні за висотою. Пропорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві та сильний на листковій пластинці з нижнього боку. Остюки світлокорицевого кольору зі слабким антоціаном. Остюки на верхівці колосу довші самого колосу. Соломина має сильний восковий наліт на верхньому міжвузлі та слабке опушення верхнього вузла. Колос короткий, циліндричної форми, середньої щільності, слабо забарвлений при достиганні і має дуже сильний восковий наліт. Зернівка видовжена з коротким чубчиком. Нижня колоскова луска видовжена, плече скошене, вузьке, зубець середньозігнутий, короткий.

Рослини заввишки 90 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 7,5-8,2 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,1-8,0 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 8,3-8,8 бала. Середньорання, достигає за 270-273 дні. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 59,6 ц/га, в зоні Лісостепу 65,2 ц/га. Гарантована різниця 6,0 ц/га. Маса 1000 зерен 43,7 г. Зерно містить 13,5-14,6% білка. Загальна оцінка крупі 9,0 бала.

® 07008001 Лінкор

Заявник:

Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насінництва та сортовищчання Української академії аграрних наук

Тип розвитку - озимий. Кущ - прямостоячий, рослини середньої висоти. Пропорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві та сильний на листковій пластинці з нижнього боку. Остюки чорного кольору зі слабким антоціаном. Остюки на верхівці колосу довші самого колосу. Соломина має сильний восковий наліт на верхньому міжвузлі та відсутнє або дуже слабке опушення верхнього вузла. Колос дуже короткий, циліндричної форми, середньої щільності, білий при достиганні і має дуже сильний восковий наліт. Зернівка видовжена з коротким чубчиком. Нижня колоскова луска дуже видовжена, плече піднесене, вузьке, зубець ледь зігнутий, короткий. Рослини заввишки 85 см. Зимостійкість сорту у польових умовах за роки випробування становила 7,5-8,0 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,3 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,0 бала.

Середньорання, достигає за 270-275 днів.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 55,6 ц/га, в зоні Лісостепу 64,4 ц/га. Маса 1000 зерен 42,0 г. Зерно містить 13,9-15,5% білка.

Загальна оцінка крупі 8,0-9,0 бала.

Степ, Лісостеп**Степ, Лісостеп****Пшениця тверда яра****07008002 Метиска**

Заявник:

Національний університет біоресурсів і природокористування

Тип розвитку - ярий. Кущ - напівпрямостоячий, рослини низькорослі. Пропорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві та слабкий на листковій пластинці з нижнього боку. Остюки світлокорицевого кольору з помірним антоціаном. Остюки на верхівці колосу довші самого колосу. Соломина має сильний восковий наліт на верхньому міжвузлі та відсутнє або дуже слабке опушення верхнього вузла. Колос середньої довжини, циліндричної форми, щільний, слабо забарвлений при достиганні і має дуже сильний восковий наліт. Зернівка напіввидовжена з коротким чубчиком. Нижня колоскова луска дуже видовжена, плече скошене, вузьке, зубець ледь зігнутий, середньої довжини.

Рослини заввишки 64-68 см. Стійкість сорту до вилягання 8,5 бала. Стійкість до осипання 8,7 бала. Стійкість до посухи 7,5 бала.

Середньостигла, достигає за 89-93 дні.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 29,1 ц/га, в зоні Лісостепу 38,2 ц/га. Гарантована різниця - 1,7-2,5 ц/га. Маса 1000 зерен 39,4 г. Зерно містить 14,2-15,0% білка. Загальна оцінка 8,0-8,5 бала.

Степ, Лісостеп