

Середня урожайність сорту за роки випробування у зоні Лісостепу 54,9 ц/га, гарантована прибавка 11,5 ц/га.. Вегетаційний період 279 днів. Висота рослини 137,7 см. Маса 1000 зерен 31,9 г. Сорт в цій зоні відносно стійкий до хвороб борошністої росси, снігової плісняви. Відносно стійкий до вилягання, 6,7 бала, осипання 8,5 балів, засухи 8,7 бала. Число падіння 236. Вміст білку 7,6 %. Серезня урожайність сорту за роки випробування у зоні Полісся 45,5 ц/га., гарантована прибавка 4,9 ц/га. Вегетаційний період 288 днів. Висота рослини 138 см. Маса 1000 зерен 33,7 г. Сорт стійкий до хвороб борошністої роси, снігової плісняви. Стійкий до вилягання 8,2 бала, осипання 8, 5 бала, засухи 8,5 бала. Число падіння 223. Вміст білку 9,0 %. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

07003003 Радомирське

Заявник: Поліська дослідна станція ім. О. М. Засухіна Інституту картоплярства Української академії аграрних наук

Тип розвитку – озимий. Рослина - диплоїд, середньої висоти, кущ - напіврозлогий. Колеоптіль середньої довжини зі слабким антоціановим забарвленням. Пропорцевий листок має дуже коротку піхву із сильним восковим нальотом та дуже коротку листкову пластинку. Соломина має середню відстань між верхнім вузлом і колосом та слабке опушення під колосом. Колос середньої довжини та щільності, має напівпохилене положенням в просторі та слабкий сизий наліт. Зернівка середньої довжини з помірним забарвленням алеїронового шару. Висока маса 1000 зерен.

Середня урожайність сорту за роки випробування у зоні Лісостепу 53,6 ц/га, гарантована прибавка 10,2 ц/га.. Вегетаційний період 281 днів. Висота рослини 139 см. Маса 1000 зерен 31,6 г. Сорт в цій зоні відносно стійкий до хвороб борошністої росси, снігової плісняви. Відносно стійкий до вилягання, 6,0 бала, осипання 7,8 балів, засухи 8,3 бала. Число падіння 206. Вміст білку 7,1 %. Серезня урожайність сорту за роки випробування у зоні Полісся 45,1 ц/га., гарантована прибавка 4,5 ц/га. Вегетаційний період 290 днів. Висота рослини 139 см. Маса 1000 зерен 33,0 г. Сорт стійкий до хвороб борошністої роси, снігової плісняви. Стійкий до вилягання 8,2 бала, осипання 8, 5 бала, засухи 8,5 бала. Число падіння 211. Вміст білку 8,8 %. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

07003006 Фестус

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Тип розвитку – озимий. Рослина - диплоїд, низька, кущ - прямостоячий. Колеоптіль середньої довжини з помірним антоціановим забарвленням. Пропорцевий листок має дуже коротку піхву із сильним восковим нальотом та дуже коротку листкову пластинку. Соломина має середню відстань між верхнім вузлом і колосом та слабке опушення під колосом. Колос середньої довжини, нещільний, має похиле положенням в просторі та слабкий сизий наліт. Зернівка середньої довжини з помірним забарвленням алеїронового шару. Висока маса 1000 зерен.

Середня урожайність сорту за роки випробування у зоні Лісостепу 70,7 ц/га, гарантована прибавка 27,3 ц/га.. Вегетаційний період 279 днів. Висота рослини 126 см. Маса 1000 зерен 31 г. Сорт в цій зоні відносно стійкий до хвороб борошністої росси, снігової плісняви. Відносно стійкий до вилягання, 6,4 бала, осипання 8,6 балів, засухи 8,7 бала. Число падіння 238. Вміст білку 7,1 %. Серезня урожайність сорту за роки випробування у зоні Полісся 55,1 ц/га., гарантована прибавка 14,5 ц/га. Вегетаційний період 285 днів. Висота рослини 123см. Маса 1000 зерен 34,5 г. Сорт стійкий до хвороб борошністої роси, снігової плісняви. Стійкий до вилягання 8,3 бала, осипання 8, 6 бала, засухи 8,8 бала. Число падіння 231. Вміст білку 8,8 %. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

© 07011006 Амур

Тритикале озиме

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Тип розвитку — озимий. Рослини низкорослі, куц — напівпрямий. Прапорцевий листок має слабе антоціанове забарвлення вушок, дуже сильний сизий восковий наліт на піхві, листкова пластинка середньої довжини, вузька. Остюки мають слабе антоціанове забарвлення, довші відносно колосу. Соломина середньо-виповнена із сильним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос білого кольору, середньої щільності, довжини та ширини, циліндричної форми з пониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска має довгий кільовий та малий другий зубець. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричневого кольору, крупна, видовженої форми, слабо-зморшувата.

Степ. Висота рослини 103,5 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування 9 балів. Стійкість сорту до вилягання 8 балів. Стійкість до осипання 9 балів. Стійкість до засухи 8 балів. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 273 днів. Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 60,8 ц/га. Прибавка до національного стандарту у зоні Степу 2,5 ц/га. Маса зерен 44 г. Зерно містить 13,6 % білку.

Лісостеп: Висота рослини 107 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування 9 балів. Стійкість сорту до вилягання 7,2 бала.

Стійкість до осипання 8,8 балів. Стійкість до посухи 8,7 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 285 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 63,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту у зоні Лісостепу 5,5 ц/га. Маса зерен 50 г. Зерно містить 12,9 % білку.

Полісся: Висота рослини 101,5 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування висока. У польових умовах за роки випробування стійкість сорту становила 9 балів. Стійкість сорту до осипання 8,5 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 286 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Полісся 49,4 ц/га. Прибавка до національного стандарту у зоні Полісся 6,4 ц/га. Маса зерен 44,5 г. Зерно містить 12,2% білка.

® 07011005 Атлет

Заявник: Приватне підприємство "Сорт"

Тип розвитку — озимий. Рослини дуже низкорослі, куц — прямий. Прапорцевий листок має відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок, сильний сизий восковий наліт на піхві, листкова пластинка дуже коротка та вузька. Остюки мають відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення, середньої довжини відносно колосу. Соломина середньо-виповнена з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос сіро-димчастого кольору, нещільний, середньої довжини, вузький, циліндричної форми з напівпрямим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска має довгий кільовий та малий другий зубець. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричневого кольору, середньої крупності, яйцеподібної форми, слабо зморшувата.

Степ. Висота рослини 98 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування 9 балів. Стійкість сорту до вилягання 8,7 бала. Стійкість до осипання 9 балів. Стійкість до засухи 8,6 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 271 днів. Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 64 ц/га. Прибавка до національного стандарту у зоні Степу 5,7 ц/га. Маса зерен 42,1 г. Зерно містить 13,5 % білку.

Лісостеп: Висота рослини 97 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування 8,6 балів. Стійкість сорту до вилягання 8,7 бала. Стійкість до осипання 9 балів. Стійкість до посухи 8,6 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 281 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 66,9 ц/га. Прибавка до національного стандарту у зоні Лісостепу 9,3 ц/га. Маса зерен 45,5 г. Зерно містить 12,5 % білку.

Полісся: Висота рослини 91,2 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування висока. У польових умовах за роки випробування стійкість сорту становила 9 балів. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала. За

Степ, Лісостеп, Полісся