Заявник:

Тип розвитку — озимий. Рослини низькорослі, кущ — напівпрямий. Прапорцевий листок має слабке антоціанове забарвлення вушок, Нижня колоскова луска має довгий кільовий та малий другий зубець. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка світлокольору, середньої щільності, довжини та ширини, циліндричної форми з пониклим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. забарвлення, довші відносно колосу. Соломина середньо-виповнена із сильним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос білого дуже сильний сизий восковий наліт на піхві, листкова пластинка середньої довжини, вузька. Остюки мають слабке антоціанове коричневого кольору, крупна, видовженої форми, слабко-зморшкувата.

Степ. Висота рослини 103,5см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування 9 балів. Стійкість сорту до вилягання 8 балів. Стійкість до Середньостиглий , достигає за 273 днів. Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 60,8 ц/га. Прибавка до національного осипання 9 балів. Стійкість до засухи 8 балів. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. стандарту у зоні Степу 2,5 ц/га. Маса зерен 44 г. Зерно містить 13,6 % білку.

шкідниками. Середньостиглий, достигає за 285 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 63,1 ц\га. Прибавка до Стійкість до осипання 8,8 балів. Стійкість до посухи 8,7 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та Лісостеп: Висота рослини 107 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування 9 балів. Стійкість сорту до вилягання 7,2 бала. національного стандарту у зоні Лісостепу 5,5 ц\га. Маса зерен 50 г. Зерно містить 12,9 % білка.

стійкість сорту становила 9 балів. Стійкість сорту до вилягання 8,5 бала. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала. За врожайність за роки випробування у зоні Полісся 49,4 ц\га. Прибавка до національного стандарту у зоні Полісся 6,4 ц\га. Маса зерен 44,5 Полісся: Висота рослини 101,5 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування висока. У польових умовах за роки випробування роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 286 діб. Середня г. Зерно містить 12,2% білка. Степ, Лісостеп, Полісся

® 07011005 Arner

011005 Атлет

Заявник: Приватне підприємство " Сорт"

забарвлення вушок, сильний сизий восковий наліт на піхві, листкова пластинка дуже коротка та вузька. Остюки мають відсутнє або дуже середню кількість плідних квіток. Зернівка світло-коричневого кольору, середньої крупності, яйцеподібної форми, слабко зморшкувата. Тип розвитку — озимий. Рослини дуже низькорослі, кущ — прямий. Прапорцевий листок має відсутнє або дуже слабке антоціанове верхньому міжвузлі. Колос сіро-димчастого кольору, нещільний, середньої довжини, вузький, циліндричної форми з напівпрямим положенням в просторі. Вісь колосу — гнучка. Нижня колоскова луска має довгий кільовий та малий другий зубець. Колосок має слабке антоціанове забарвлення, середньої довжини відносно колосу. Соломина середньо-виповнена з помірним опушенням на

Степ. Висота рослини 98см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування 9 балів. Стійкість сорту до вилягання 8,7 бала. Стійкість до Середньостиглий , достигає за 271 днів. Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 64 ц/га. Прибавка до національного осипання 9 балів. Стійкість до засухи 8,6 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. стандарту у зоні Степу 5,7 ц/га. Маса зерен 42,1 г. Зерно містить 13,5 % білку.

шкідниками. Середньостиглий, достигає за 281 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 66,9 ц\га. Прибавка до Лісостеп: Висота рослини 97 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування 8,6 балів. Стійкість сорту до вилягання 8,7 бала. Стійкість до осипання 9 балів. Стійкість до посухи 8,6 бала.За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та національного стандарту у зоні Лісостепу 9,3 ц\га. Маса зерен 45,5 г. Зерно містить 12,5 % білка.

стійкість сорту становила 9 балів. Стійкість сорту до вилягання 9 балів. Стійкість до осипання 8,8 бала. Стійкість до посухи 8,8 бала. За Полісся: Висота рослини 91,2 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування висока. У польових умовах за роки випробування

врожайність за роки випробування у зоні Полісся 51,1 ц\га. Прибавка до національного стандарту у зоні Полісся 8,1ц\га. Маса зерен 42 г. роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий , достигає за 286 діб. Середня Зерно містить 12,1% білка.

Овес посівний

® 06005002 Бусол

Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук

Рослина пряма, за довжиною довга, час викидання волоті - середній. Волоть: середньої довжини, орієнтація гілочок стисла, положення гілочок напівпряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини. Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски - відсутня, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Зерно: колір нижньої квіткової луски-жовтий. Первинне зерно: має середні базальні волоски, та середній стрижень другого зерна.

стартовим ростом до викидання волоті, достигає одночасно із стандартом. Сорт посухостійкий, стійкий проти вилягання. Під час Тип розвитку - ярий. Різновидність - ауреа. Середньостиглий, вегетаційний період в зоні Степу - 91 день, відрізняється швидким збирання осипається мало.

Маса 1000 насінин - 35,2 г, плівчастість - 24,2 %, сирого протеїну - 16,0 %.

Стебло середньої висоти - 70 см, міцне. Кущ прямостоячий.

За роки державного випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин в зоні Степу отримали середній урожай 29,7 ц/ га, що на 2,1 відсотки більше стандартів.Потенційна можливість сорту - 65 ц/га.

Агортехніка звичайна для зони вирощування. Стійкий до ураження борошнистою росою.Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200 ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Шведською мухою пошкоджується менше стандартів. Придатний для поширення в зоні Степу.

07005001 Дарунок

Заявник:

Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук

Степ, Лісостеп, Полісся

Роспина за габітусом проміжна, середньої довжини,рідко зустрічаються рослини із закрученими прапорцевими листками, час викидання луски, тенденція до остистості помірна. Колір нижньої квіткової луски - білий. Первинне зерно: має короткі базальні волоски, та середній стебла відсутня. Волоть: середньої довжини, оріснтація гілочок стисла, положення гілочок напівпряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини та слабкою сіруватістю. Первинне зерно: відсутня помірна сіруватість нижньої квіткової волоті - середній. На найнижчих листках опушеність листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стрижень другого зерна.

Вегетаційний період 89 - 102 дн. Сорт середньостиглий. Маса 1000 насінин 27,6 - 32,2 г.

Стійкий проти вилягання, осипаня та посухи.

Урожайний. За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 28,2 - 40,8 ц / га, що на 3,7 - 11,6 відсотків більше національних стандартів.

Круп"яні якості добрі. Плівчастість 23,8 - 30,3 %, білок в зерні складає 13,1 - 15,2 % Сорт стійкий проти сажки, середньо уражується корончастою і стебловою іржею. Рекомендований для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

08005001 Марафон

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Р

Республіканське унітарне підприсмство"Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі по землеробству"