

роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 286 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Полісся 51,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту у зоні Полісся 8,1ц/га. Маса зерен 42 г. Зерно містить 12,1% білка.

## Овес посівний

### ® 06005002 Бусол

Степ

Заявник:

Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук

Рослина пряма, за довжиною довга, час викидання волоті – середній. Волоть: середньої довжини, орієнтація гілочок стисла, положення гілочок напівпряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини. Первинне зерно: сіруватість нижньої квіткової луски – відсутня, тенденція до остистості відсутня або дуже слабка. Зерно: колір нижньої квіткової луски-жовтий. Первинне зерно: має середні базальні волоски, та середній стрижень другого зерна.

Тип розвитку - ярий. Різновидність - ауреа. Середньостиглий, вегетаційний період в зоні Степу - 91 день, відрізняється швидким стартовим ростом до викидання волоті, досягає одночасно із стандартом. Сорт посухостійкий, стійкий проти вилягання. Під час збирання осипається мало.

Маса 1000 насінин - 35,2 г, плівчастість - 24,2 %, сирого протеїну - 16,0 %.

Стебло середньої висоти - 70 см, міцне. Кущ прямостоячий.

За роки державного випробування на обласних державних центрах експертизи сортів рослин в зоні Степу отримали середній урожай - 29,7 ц/га, що на 2,1 відсотки більше стандартів. Потенційна можливість сорту - 65 ц/га.

Агортехніка звичайна для зони вирощування. Стійкий до ураження борошнистою росою. Протрусіння насіння препаратом Вітавакс 200 ФФ забезпечує повний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Шведською мухою пошкоджується менше стандартів. Придатний для поширення в зоні Степу.

### 07005001 Дарунок

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник:

Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом проміжна, середньої довжини, рідко зустрічаються рослини із закрученими прапорцевими листками, час викидання волоті - середній. На найнижчих листках опушеність листової пластинки відсутня або дуже слабка. Опушеність на найвищому вузлі стебла відсутня. Волоть: середньої довжини, орієнтація гілочок стисла, положення гілочок напівпряме, положення вторинних колосків поникле. Колоскові луски середньої довжини та слабкою сіруватістю. Первинне зерно: відсутня помірна сіруватість нижньої квіткової луски, тенденція до остистості помірна. Колір нижньої квіткової луски - білий. Первинне зерно: має короткі базальні волоски, та середній стрижень другого зерна.

Веgetаційний період 89 - 102 дн. Сорт середньостиглий. Маса 1000 насінин 27,6 - 32,2 г.

Стійкий проти вилягання, осипана та посухи.

Урожайний. За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 28,2 - 40,8 ц / га, що на 3,7 - 11,6 відсотків більше національних стандартів.

Сорт стійкий проти сажки, середньо уражується корончастою і стебловою іржею.

Круп'яні якості добрі. Плівчастість 23,8 - 30,3 %, білок в зерні складає 13,1 - 15,2 %

Рекомендований для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

### 08005001 Марафон

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник:

Республіканське унітарне підприємство "Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі по землеробству"