

Стійкість проти вилягання та осипання досить висока. Посухостійкість вища середньої. В умовах надмірного зволоження вилягає.

За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 22,7 - 31,4 ц / га.,
Сорт має підвищений вміст білка 13,8 - 18,6 відсотки.

Стійкий проти летючої сажки, слабо уражується бактеріальним опіком, Шведською мухою пошкоджується нижче стандартів.
Рекомендований для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся

ЯЧМІНЬ ЗВИЧАЙНИЙ ОЗИМИЙ

® 06012026 Жерар

Степ, Лісостеп

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок з помірним антоціановим забарвленням вушок та помірним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з горизонтальним положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має півку, довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилки зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борідки, фронтальне розташування лодикул. Алеїроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 54 ц/га., гарантована прибавка 2,3 ц/га. Вегетаційний період 254 днів. Сорт стійкий до хвороб борошністої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, вилягання 8,2 балів, та засухи 8,5 балів. Вміст білку 13,7%. Висота рослин 88 см. Маса 1000 зерен 42,9 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 62,3 ц/га., гарантована прибавка врожаю 6,3 ц/га. Вегетаційний період 258 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошністої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,1 балів, вилягання 8,2 балів, та стійкий проти засухи 8,7 бала. Вміст білку 13,5 %. Висота рослин 89 см. Маса 1000 зерен 41,5 г.

® 07012009 Кондрат

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок зі слабким антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають сильне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з прямим положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, короткої та середньої щільності. Стрижень колосу першого сегмента короткої та відсутній або дуже слабкий вигин. Зернівка має півку, довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилки зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борідки, охоплююче розташування лодикул. Алеїроновий шар зернівки білястий, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - короткий.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 57,6 ц/га., гарантована прибавка 5,9 ц/га. Вегетаційний період 257 днів. Сорт стійкий до хвороб борошністої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, вилягання 8,8 бала, та засухи 9 балів. Вміст білку 13,0 %. Висота рослин 90,1 см. Маса 1000 зерен 38,1 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 68,2 ц/га., гарантована прибавка врожаю 12,2 ц/га. Вегетаційний період 263 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошністої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,7 балів, вилягання 8,6 балів, та стійкий проти засухи 8,8 балів. Вміст білку 12,7 %. Висота рослин 92,2 см. Маса 1000 зерен 37,4 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 57,1 ц/га., гарантована прибавка 7,1 ц/га. Вегетаційний період 274 днів.

Сорт відносно стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, та засухи 8,7 балів, стійкий до вилягання 9 балів. Вміст білку 12,5%. Висота рослин 85,7 см. Маса 1000 зерен 40,4 г. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

07012015 Наомі

Заявник:

Заатен-Уніон ГмбХ

Степ, Лісостеп, Полісся

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок з відсутнім антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - середній. Соломина - слабковиповнена. Остюки з відсутнім антоціановим забарвленням на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з напівпрямим положенням в просторі, має більше двох рядів, пірамідальної форми, короткий, нещільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має півку, довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення жилки зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній. Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 53,5ц/га., гарантована прибавка 1,8 ц/га. Вегетаційний період 259 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,8 бала, та засухи 8,1 балів. Вміст білку 13,7 %. Висота рослин 88 см. Маса 1000 зерен 43,4 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 68,4 ц/га., гарантована прибавка врожаю 12,4 ц/га. Вегетаційний період 261 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошнистої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,6 балів, вилягання 8,7 балів, та стійкий проти посухи 9,0 балів. Вміст білку 12,7 %. Висота рослин 88 см. Маса 1000 зерен 48,6 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 55,2 ц/га., гарантована прибавка 5,2 ц/га. Вегетаційний період 272 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, та посухи 9 балів, стійкий до вилягання 9 балів. Вміст білку 12,6%. Висота рослин 83 см. Маса 1000 зерен 47,5 г. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

© 07012008 Переможець

Заявник:

Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Степ, Лісостеп, Полісся

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок зі слабким антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабковиповнена. Остюки мають слабе антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з напівпрямим положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, короткий, щільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та слабкий вигин. Зернівка має півку, довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилки зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної боріздки, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній. Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 57,3 ц/га., гарантована прибавка 5,6 ц/га. Вегетаційний період 257 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,5 балів, вилягання 8,5 балів, та засухи 8,8 балів. Вміст білку 13,6 %. Висота рослин 89,6 см. Маса 1000 зерен 37,9 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 68,5 ц/га., гарантована прибавка врожаю 12,5 ц/га. Вегетаційний період 256 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошнистої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,3 бала, вилягання 8,5 бала, та стійкий проти засухи 8 балів. Вміст білку 12,6 %. Висота рослин 87,5 см. Маса 1000 зерен 38,1 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 51,3 ц/га., гарантована прибавка 1,3 ц/га. Вегетаційний період 270 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, та засухи 8,6