

Сорт відносно стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, та засухи 8,7 балів, стійкий до вилягання 9 балів. Вміст білку 12,5%. Висота рослин 85,7 см. Маса 1000 зерен 40,4 г. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

## 07012015 Наомі

Заявник:

Заатен-Уніон ГмбХ

## Степ, Лісостеп, Полісся

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок з відсутнім антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - середній. Соломина - слабковиповнена. Остюки з відсутнім антоціановим забарвленням на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з напівпрямим положенням в просторі, має більше двох рядів, пірамідальної форми, короткий, нещільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має півку, довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення жилки зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплююче розташування лодикул. Алеїроновий шар зернівки сильно забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній. Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 53,5ц/га., гарантована прибавка 1,8 ц/га. Вегетаційний період 259 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,8 бала, та засухи 8,1 балів. Вміст білку 13,7 %. Висота рослин 88 см. Маса 1000 зерен 43,4 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 68,4 ц/га., гарантована прибавка врожаю 12,4 ц/га. Вегетаційний період 261 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошнистої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,6 балів, вилягання 8,7 балів, та стійкий проти посухи 9,0 балів. Вміст білку 12,7 %. Висота рослин 88 см. Маса 1000 зерен 48,6 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 55,2 ц/га., гарантована прибавка 5,2 ц/га. Вегетаційний період 272 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, та посухи 9 балів, стійкий до вилягання 9 балів. Вміст білку 12,6%. Висота рослин 83 см. Маса 1000 зерен 47,5 г. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

## © 07012008 Переможець

Заявник:

Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю

## Степ, Лісостеп, Полісся

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок зі слабким антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабковиповнена. Остюки мають слабе антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з напівпрямим положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, короткий, щільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та слабкий вигин. Зернівка має півку, довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилки зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, фронтальне розташування лодикул. Алеїроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній. Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 57,3 ц/га., гарантована прибавка 5,6 ц/га. Вегетаційний період 257 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, вилягання 8,5 балів, та засухи 8,8 балів. Вміст білку 13,6 %. Висота рослин 89,6 см. Маса 1000 зерен 37,9 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 68,5 ц/га., гарантована прибавка врожаю 12,5 ц/га. Вегетаційний період 256 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошнистої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,3 бала, вилягання 8,5 бала, та стійкий проти засухи 8 балів. Вміст білку 12,6 %. Висота рослин 87,5 см. Маса 1000 зерен 38,1 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 51,3 ц/га., гарантована прибавка 1,3 ц/га. Вегетаційний період 270 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, та засухи 8,6

балів, стійкий до вилягання 8,5 балів. Вміст білку 12,1%. Висота рослин 90,6 см. Маса 1000 зерен 41,6 г. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

### © 07012010 Платон

### Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок з відсутнім антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки мають відсутнє або слабе антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з прямим положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, щільний, короткий. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та слабкий вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилки зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, фронтальне розташування лодикул. Алеїроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 54,5 ц/га., гарантована прибавка 2,8 ц/га. Вегетаційний період 256 днів. Сорт стійкий до хвороб борошністої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,9 балів, вилягання 8,5 балів, та засухи 8,3 балів. Вміст білку 13,4 %. Висота рослин 87 см. Маса 1000 зерен 40,4 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 69,5 ц/га., гарантована прибавка врожаю 13,5 ц/га. Вегетаційний період 261 день. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошністої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,4 балів, вилягання 8,3 балів, та стійкий проти засухи 9 балів. Вміст білку 12,9 %. Висота рослин 88,6 см. Маса 1000 зерен 43,3 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 54 ц/га., гарантована прибавка 4 ц/га. Вегетаційний період 268 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб борошністої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, та засухи 8,9 балів, стійкий до вилягання 9 балів. Вміст білку 12,8%. Висота рослин 85,8 см. Маса 1000 зерен 43,9 г. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

### 07012007 Скарпія

### Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмБХ

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, високі. Прапорцевий листок з відсутнім антоціановим забарвленням вушок та помірним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиповнена. Остюки з відсутнім антоціановим забарвленням на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з напівпрямим положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, середньої довжини, нещільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, охоплююче розташування лодикул. Алеїроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перкриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 61,3 ц/га., гарантована прибавка 9,6 ц/га. Вегетаційний період 256 днів. Сорт стійкий до хвороб борошністої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,8 балів, вилягання 8,8 бала, та засухи 8,8 балів. Вміст білку 13,3 %. Висота рослин 92,1 см. Маса 1000 зерен 44,3 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 67,9 ц/га., гарантована прибавка врожаю 11,9 ц/га. Вегетаційний період 258 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошністої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,6 балів, вилягання 8,8 балів, та стійкий проти засухи 9 балів. Вміст білку 12,8 %. Висота рослин 93,1 см. Маса 1000 зерен 47,3 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 63,3 ц/га., гарантована прибавка 13,3 ц/га. Вегетаційний період 269 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб борошністої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, та засухи 9 балів, стійкий до вилягання 8,7 балів. Вміст білку 12,4%. Висота рослин 89,8 см. Маса 1000 зерен 48,7 г. Добрі результати дає при внесенні повного