

балів, стійкий до виплягання 8,5 балів. Вміст білку 12,1%. Висота рослин 90,6 см. Маса 1000 зерен 41,6 г. Добре результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

⑧ 07012010 Платон

Заявник:

Державна наукова установа Краснодарський науково-дослідний інститут сільського господарства ім. П.П. Лук'яненка

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Пропорцевий листок з відсутнім антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиловна. Остиоки мають відсутнє або слабке антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з прямим положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, щільний, короткий. Стрижень колосу мас середньо довжину першого сегмента та слабкий вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опущення центральної борізди, фронтальне розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкоzmоршкувата, опущення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 54,5 ц/га, гарантована прибавка 2,8 ц/га. Вегетаційний період 256 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,9 балів, вилігання 8,5 балів, та засухи 8,3 балів. Вміст білку 13,4 %. Висота рослин 87 см. Маса 1000 зерен 40,4 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 69,5 ц/га., гарантована прибавка врізжаю 13,5 ц/га. Вегетаційний період 261 день. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошнистої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,4 балів, вилігання 8,3 балів, та стійкий проти засухи 9 балів. Вміст білку 12,9 %. Висота рослин 88,6 см. Маса 1000 зерен 43,3 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 54 ц/га., гарантована прибавка 4 ц/га. Вегетаційний період 268 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, та засухи 8,9 балів, стійкий до вилігання 9 балів. Вміст білку 12,8%. Висота рослин 85,8 см. Маса 1000 зерен 43,9 г. Добре результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

07012007 Скарпія

Заявник:

Заатен-Уніон ГмбХ

Тип розвитку - озимий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, високі. Пропорцевий листок з відсутнім антоціановим забарвленням вушок та помірним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - ранній. Соломина - слабовиловна. Остиоки з відсутнім антоціановим забарвленням на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з напівпрямим положенням в просторі, має більше двох рядів, циліндричної форми, середньої довжини, нещільний. Стрижень колосу мас середньо довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має плівку, довгі волоски основної щетинки, помірне антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опущення центральної борізди, охоплююче розташування лодикул. Алейроновий шар зернівки слабко забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкоzmоршкувата, опущення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 61,3 ц/га, гарантована прибавка 9,6 ц/га. Вегетаційний період 256 днів. Сорт стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,8 балів, вилігання 8,8 балів, та засухи 8,8 балів. Вміст білку 13,3 %. Висота рослин 92,1 см. Маса 1000 зерен 44,3 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 67,9 ц/га., гарантована прибавка 11,9 ц/га. Вегетаційний період 258 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошнистої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,6 балів, вилігання 8,8 балів, та стійкий проти засухи 9 балів. Вміст білку 12,8 %. Висота рослин 93,1 см. Маса 1000 зерен 47,3 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 63,3 ц/га., гарантована прибавка 13,3 ц/га. Вегетаційний період 269 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 9 балів, та засухи 9 балів, стійкий до вилігання 8,7 балів. Вміст білку 12,4%. Висота рослин 89,8 см. Маса 1000 зерен 48,7 г. Добре результати дає при внесенні повного