

мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

® 07012005 Хайлайт

Заявник: Дойче Заатферделунг АГ

Тип розвитку - озимий. Рослини від напіврозлого до розлогого габітусом та від високої до дуже високої висоти. Прапорцевий листок з відсутнім антоціановим забарвленням вушок та сильним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - середній. Остюки з відсутнім антоціановим забарвленням на кінчиках, довжина відносно колоса - від середнього до довгого. Колос із помірним восковим нальотом, з напівпрямим положенням у просторі, багаторядний, циліндричної форми, довгий та від середньої щільності до щільного. Стрижень колосу має від середньої довжини першого сегмента до довгої та слабкий вигин. Зернівка має півку, довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення жилки зовнішньої квіткової луски, наявне опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул. Алеїроновий шар зернівки білястий.

Середня урожайність сорту у зоні Степу за роки випробування 54,6 ц/га., гарантована прибавка 2,9 ц/га. Вегетаційний період 258 днів. Сорт стійкий до хвороб борошністої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,8 балів, вилягання 8,4 балів, та засухи 8,1 балів. Вміст білку 13,2 %. Висота рослин 92 см. Маса 1000 зерен 47,1 г. В зоні Лісостепу середня урожайність сорту 60,2 ц/га., гарантована прибавка врожаю 4,2 ц/га. Вегетаційний період 259 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб, борошністої роси і гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,4 балів, вилягання 9 балів, та стійкий проти засухи 8,4 бала. Вміст білку 13,0 %. Висота рослин 98,6 см. Маса 1000 зерен 50,8 г. Середня урожайність сорту у зоні Полісся за роки випробування 56,4 ц/га., гарантована прибавка 6,4 ц/га. Вегетаційний період 272 днів. Сорт відносно стійкий до хвороб борошністої роси та гельмінтоспоріозу. Стійкий до осипання 8,6 балів, та засухи 8,5 балів, стійкий до вилягання 8,5 балів. Вміст білку 12,6%. Висота рослин 100,6 см. Маса 1000 зерен 47,8 г. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Агротехніка звичайна для зон вирощування.

Ячмінь звичайний ярий

06012029 Джей Бі Мальтазія

Заявник: Заатцухт Йозеф Бройн ГмбХ і Ко. КГ

Тип розвитку – ярий. Куш напівпряmostоячий, рослини за висотою середні. Прапорцевий листок – антоціанове забарвлення вушок сильна, восковий наліт на піхві помірний. Початок колосіння – середній. Соломина - слабо виповнена. Остюки мають слабе антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колосу. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, прямий, дворядний, циліндричної форми, нещільний та середній за довжиною. Зернівка з наявною півкую, має довгі волоски основної щетинки, відсутнє опушення вентральної боріздки, охоплююче розташування лодикул, алеїроновий шар зернівки слабо забарвлений, видовжено-еліптична, поверхня тонко зморшувата. Вушка мають загострену форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок – середній.

Середньостиглий, вегетаційний період 85 - 98 днів. Маса 1000 насінин 39,5 - 44,6 г.

Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Пластичний, стійкий до посухи, полягання та осипання. Краще стандартів використовує осадки другої половини вегетації.

За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин. Урожайний. На обласних державних центрах експертизи сортів рослин за роки випробування отримали середній урожай 42,4 - 51,2 ц / га, що на 4,9 - 14,9 відсотки більше стандартів.

Відноситься до сортів пивоварного призначення. Білка мас 11,8 %, екстрактивних речовин - 79 - 81 %.

Стійкий до борошністої роси, гельмінтоспоріозу. Агротехніка звичайна для зони вирощування. Протрусення насіння препаратом Вітавакс 200 фф забезпечує повний захист рослин від хвороб.