

® 07012029 IN 0616

Заявник:

Лімагрейн Адванта Ніделенд Б.В.

Тип розвитку - ярий. Рослини з напіврозлогим габітусом, низькорослі. Пропорцевий листок з помірним антоціановим забарвленням вушок та помірним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки з дуже сильним антоціановим забарвленням на кінчиках і довші відносно колоса. Колос з помірним восковим нальотом, з напівпрямим положенням в просторі, дворядний, циліндричної форми, середньої довжини, нещільний. Стрижень колосу має коротку довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має півку, довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення шар зернівки зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплююче розташування лодикул. Алеїроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня грубозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та повне охоплення соломини. Язичок - середній.

Сорт середньостиглий, вегетаційний період в зонах Степу складає 88 днів, Лісостепу 90 днів, Полісся 96 днів. Солома міцна, стійка проти вилягання. Рослини висотою 60 - 65 см.

Добре куциться. За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4,0 - 4,5 млн / га насінин.

Сорт інтенсивного типу. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення. Запізнення із сібною на 5 - 10 днів призводить до значного недобору врожаю.

За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 39,6 - 48,5 ц / га, що на 10,3 - 18,2 відсотки більше національних стандартів. Стійкий до осипання та посухи. Маса 1000 насінин 42,4 - 46,4 г. Потенційна можливість сорту 7,5 - 9,0 т / га.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Пивоварні якості добрі. Білка має 11,5 - 11,7 відсотки, півчастість 7 - 8 відсотків, екстрактивних речовин 78 - 80 відсотків та вирівняність зерна складає 91,6 - 96,2 відсотки.

Стійкий до борошністої роси, гелмінтоспоріозом уражується на рівні стандартів.

Рекомендований для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся.

® 05012001 Кристалія

Заявник:

Сінгента Сідз ЛТД

Полісся

Тип розвитку - ярий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середньорослі. Пропорцевий листок з помірним антоціановим забарвленням вушок та помірним восковим нальотом на піхві. Початок колосіння - середній. Соломина - слабовиповнена. Остюки зі слабким антоціановим забарвленням на кінчиках і довші відносно колоса. Колос з помірним восковим нальотом, з горизонтальним положенням в просторі, дворядний, циліндричної форми, середньої довжини, нещільний. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має півку, довгі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення жилки зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплююче розташування лодикул. Алеїроновий шар зернівки білястий, форма ромбічна, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та перекриваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Середньостиглий, вегетаційний період в зоні Полісся 94 дні. Стійкий проти вилягання, осипання, Посухостійкість середня.

Сорт інтенсивного типу. За даними заявника рекомендується висівати за 100 - відсоткової господарської придатності 4 - 4,5 млн / га насінин. Агротехніка звичайна для зони вирощування. Добре реагує на повне мінеральне живлення. Запізнення із сібною на 5 - 10 днів призводить до значного недобору врожаю ( від 3,5 до 7 ц / га ) та погіршення якості зерна.

Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200 фф забезпечує повний захист рослин від хвороб і підвищення врожаю.

За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай в зоні Полісся 50,6 ц / га, що на 12,9