

відсотки більше національних стандартів. Потенційна можливість сорту 85 центнерів з гектара. Пивоварні якості добрі. Білка має 11,8 %, плівчастість 8 - 9 %, екстрактивних речовин 78 - 80 %, вирівняність зерна складає 95,7 %.

Стійкий до борошнистої роси, карликової іржі, гельмінтоспоріозу. Рекомендований для порширення в зоні Полісся

06012030 Козацький

Полісся

Заявник: Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Тип розвитку - ярий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок з відсутнім антоціановим забарвленням вушок та помірним восковим нальотом на півві. Початок колосіння - середній. Соломина - слабвовиповнена. Остюки із відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням на кінчиках і довші відносно колоса. Колос із відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, з прямим положенням в просторі, дворядний, циліндричної форми, нещільний, середньої довжини. Стрижень колосу має середню довжину першого сегмента та слабкий вигин. Зернівка без плівки, короткі волоски основної щетинки, відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплююче розташування лодикул. Алеїроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма видовжено-еліптична, поверхня тонкозморшувата. Вушка мають загострену форму верхівки та переक्रиваюче охоплення соломини. Язичок середньої довжини.

Рослини висотою 63-70 см. Середньостиглий, вегетаційний період 87-98 днів. Маса 1000 насінин 41,3-46,8 см.

Потенційна врожайність сорту 75 ц/га.

За даними заявника рекомендується висівати за 100-відсоткової господарської придатності 5 млн/га насінин.

Борошнистою росю, гельмінтоспоріозом та летючою сажкою уражується нижче стандартів. Протруєння насіння препаратом Максим забезпечує повний захист рослин від хвороб.

® 06012015 Оберіг

Заявник: Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Тип розвитку - ярий. Рослини з напівпрямостоячим габітусом, середні за висотою. Прапорцевий листок зі слабким антоціановим забарвленням вушок та помірним восковим нальотом на півві. Початок колосіння - середній. Соломина - слабвовиповнена. Остюки мають помірне антоціанове забарвлення на кінчиках і довші відносно колоса. Колос зі слабким восковим нальотом, з прямим положенням в просторі, дворядний, циліндричної форми, середньої довжини та щільності. Стрижень колосу має коротку довжину першого сегмента та помірний вигин. Зернівка має плівку, короткі волоски основної щетинки, слабе антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски, відсутнє опушення вентральної борізки, охоплююче розташування лодикул. Алеїроновий шар зернівки слабо забарвлений, форма еліптична, поверхня тонкозморшувата, опушення зовнішньої квіткової луски відсутнє. Вушка мають шилоподібну форму верхівки та переक्रиваюче охоплення соломини. Язичок - середній.

Рослини висотою 74-82 дні. Вегетаційний період 86- 98 днів. Маса 1000 насінин 40,0-45,9 г.

Потенційна врожайність сорту 96ц/га. За даними заявника рекомендується висівати за 100- господарської придатності 4,5 -5 млн/га насінин.

Борошнистою росю, гельмінтоспоріозом пошкоджується менше стандартів. Перед посівом рекомендується протруєвати насіння препаратом Максим.

06012009 Ратник

Заявник: Державна наукова установа Всеросійський науково - дослідний інститут зернових культур ім. І.Г.Калиненко