

- короткій (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 70,1 ц/га, гарантований приріст складає 3,4 ц/га. Стійкість до засухи 7,7 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 82,5%. Вміст крохмалю відповідно - 72,1%, білка 9,0%.

### 08004038 Агральп - 200

Степ

Заявник: Панам Франція САРЛ

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 74,1 ц/га, гарантований приріст складає 7,4 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,6%. Вміст крохмалю - 74,7%, білка 9,0%.

### 05004041 Арріго

Степ, Полісся

Заявник: Заатбау Лінц рег. Ген.м.б.Х

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 78,1 ц/га, Полісся - 90,6 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 11,3 ц/га, та 7 ц/га. Стійкість до засухи 8,5-8,8 балів, вилягання - 8,8-9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 80,6%, Полісся - 73,7 %. Вміст крохмалю відповідно - 72,5% та 73,2%, білка 9,1%.

### ® 07004125 Ааспід

Степ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть,

см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу - 76,1 ц/га, гарантований приріст складає 9,4 ц/га. Стійкість до засухи 7,8 балів, вилягання - 8,9 балів, пухирчастості сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,8%. Вміст крохмалю відповідно - 72,8%, білка 9,4%.

## ® 06004051 Артемів 280 СВ

Степ

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава"

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - помірна. Зигзагоподібність стебла - відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - дуже сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірна. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Інтенсивність забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 8,1 до 10,0 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів - середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини - жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 78,0 ц/га, гарантована прибавка до стандарту становить 15,8 ц/га. Стійкість до засухи 7,2 бали, вилягання 9 балів, пухирчастості сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 79,8 %. Вміст крохмалю 71,6 %, білку 9,7 %.

## 08004020 Анкора

Степ

Заявник: ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - дуже сильне. Зигзагоподібність стебла - дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабе. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок (за винятком основи) - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка.

Антоціанове забарвлення піхви листка - від відсутнього або дуже слабого до слабого. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - від короткого до середнього. Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів - середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 88,2 ц/га, гарантована прибавка складає - 26 ц/га. Стійкість до засухи 8,5 балів, вилягання 9 балів, пухирчастості сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 79,0 %. Вміст крохмалю 72,7 %, білку 9,4 %.

## 08004027 Агральп - 260

Степ

Заявник: Панам Франція САРЛ

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи