

незначне.

06017042 Ксенія

Заявник: Науково-дослідний центр "Магроселект"

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчастістю. Зубці дрібні. У поперечному розрізі форма листка слабо увігнута, верхівка загострена, крила листка слабо виражені, помірна наявність вусок. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, довгі за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини високі, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім'янок злегка випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, товста чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,7 ц/га; в зоні Лісостепу 28,6 ц/га, гарантована прибавка 3,3 ц/га. Вміст жиру 49,7 - 50,9 %, білку 16,2 - 16,8 %. Вихід олії 1446 - 1502 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017001 Каменяр

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з помірними пухирчастістю, зубцями та вусками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені але й чітко округлі, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження висота, але й чітко округлі, верхівка коротка, зелений колір із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,6 ц/га; в умовах Лісостепу 27,1 ц/га, гарантована прибавка 1,8 ц/га. Вміст жиру 49,9 %, білку 16,7 - 17,2 %. Вихід олії 1342 - 1504 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017033 ЛГ 5654 КЛ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - сильна. Листок середнього розміру з помірно пухирчастістю, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та короткі. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір

Степ, Лісостеп

Степ, Лісостеп

Лісостеп