

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – слабе. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” – відсутнє або дуже слабе. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19 – 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна. Урожайність по зоні Степу 88,1 ц/га, Лісостепу - 92,0 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Лісостепу - 2,5 ц/га. Стійкість до засухи 7,8-8,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 84,1-78,2 %. Вміст крохмалю 74,6-74,4 %, білку 8,6-9,7 %.

07004083 ДКС 3476

Степ

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – від слабкого до помірного. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – від слабкого до помірного, антоціанове забарвлення колоскової луски за виключення основи – сильне. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” - помірна. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини –жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – слабка.

Урожайність по зоні Степу 83,7 ц/га, гарантована прибавка складає - 21,5 ц/га. Стійкість до засухи 7,5 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 84,4 %. Вміст крохмалю 73,8 %, білку 8,5 %.

07004084 ДКС 5170

Степ

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 89,0ц/га, гарантований приріст складає 6,9 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 84,7%. Вміст крохмалю відповідно - 73,3%, білка 10,2%.

® 07004085 ДКС 4964

Степ, Лісостеп

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл