

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – слабе. Волоть середньоощільна. Час появи шовку на качані – пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” – слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19 – 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – від слабкої до помірної.

Урожайність по зоні Степу 98,2 ц/га, Лісостепу - 90,6 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 33,5 ц/га, в зоні Лісостепу - 2 ц/га. Стійкість до засухи 8,7-8,8 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 84,2-77,8 %. Вміст крохмалю 74,6-72,8 %, білку 8,4-9,7 %.

® 07004086 ДКС 4860

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Степ

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – дуже сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – помірне, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи – сильне. Волоть середньоощільна. Час появи шовку на качані – від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” – слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – довга (від 20,1 до 40 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19 – 22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 92,4 ц/га, гарантована прибавка складає - 16,2 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 84,2 %. Вміст крохмалю 73,8 %, білку 8,3 %.

07004087 ДКС4983

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Степ

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від пізнього до дуже пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – сильне. Волоть середньоощільна. Час появи шовку на качані – від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” – помірна. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – від середньої до довгої. Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – слабка.

Урожайність по зоні Степу 85,8 ц/га, гарантована прибавка складає - 9,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 84,5 %. Вміст крохмалю 74,5 %, білку 8,0 %.

07004088 ДКС3795

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Степ, Лісостеп