

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – помірне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – слабе. Волоть нещільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” – слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий.

Урожайність по зоні Степу 79,3 ц/га, Лісостепу - 97,1 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Лісостепу - 7,6 ц/га. Стійкість до засухи 8-9 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 84,6-80,2 %. Вміст крохмалю 73,6-71,0 %, білку 8,7-9,7 %.

® 07004090 ДКС 5276

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – пізній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” – слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – слабка.

Урожайність по зоні Степу 90,1 ц/га, гарантована прибавка складає - 13,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,3 %. Вміст крохмалю 72,1 %, білку 8,4 %.

06004113 ДКС2870

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – пізній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабе. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” – слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – середня (від 15 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – слабка.

Урожайність по зоні Степу 78,3 ц/га, гарантована прибавка складає 16,1 ц/га. Стійкість до засухи 7,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,2 %. Вміст крохмалю 73,6 %, білку 9,6 %.

® 07004037 ДМС Сектор

Заявник: Науково-виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної

Степ

Степ

Степ, Лісостеп