

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – помірне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – слабе. Волоть нещільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” – слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий.

Урожайність по зоні Степу 79,3 ц/га, Лісостепу - 97,1 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу- 17,6 ц/га, в зоні Лісостепу - 7,6 ц/га. Стійкість до засухи 8-9 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 84,6-80,2 %. Вміст крохмалю 73,6-71,0 %, білку 8,7-9,7 %.

® 07004090 ДКС 5276

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – пізній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” – слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – слабка.

Урожайність по зоні Степу 90,1 ц/га, гарантована прибавка складає - 13,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,3 %. Вміст крохмалю 72,1 %, білку 8,4 %.

06004113 ДКС2870

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – пізній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабе. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” – слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – середня (від 15 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – слабка.

Урожайність по зоні Степу 78,3 ц/га, гарантована прибавка складає 16,1 ц/га. Стійкість до засухи 7,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,2 %. Вміст крохмалю 73,6 %, білку 9,6 %.

® 07004037 ДМС Сектор

Заявник: Науково-виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної

Степ

Степ

Степ, Лісостеп

осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 101 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу 97,1 ц/га, Лісостепу - 90,1 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 32,4 ц/га, в зоні Лісостепу - на рівні стандарту. Стійкість до засухи 8,0-8,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастості сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 79,1-79,0 %. Вміст крохмалю 70,9-73,4 %, білку 9,1-9,9 %.

® 07004038 ДМС Адаптер

Заявник: Науково-виробниче фермерське господарство "Компанія "Maic"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення луски - слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 74,4 ц/га, гарантована прибавка складає - 9,7 ц/га. Стійкість до засухи 7,5 балів, вилягання 9 балів, пухирчастості сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 78,3 %. Вміст крохмалю 73,1 %, білку 9,6 %.

® 07004040 Депозит МС

Заявник: Науково-виробниче фермерське господарство "Компанія "Maic"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення лусок - сильне, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 67,8 ц/га, гарантований приріст складає 8 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастості сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,4%. Вміст крохмалю відповідно - 72,8%, білка 10,1%.

06004015 ДК 287

Заявник: Монсанта Інтернешнл Сьорл

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення

Степ

Степ, Лісостеп, Полісся