

осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (від 101 до 12,0 см) - довгага (від 151 до 200 см). Пластиинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 101 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернини за довжиною - середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовтогранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення пусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу 97,1 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 32,4 ц/га, в зоні Лісостепу - на рівні стандарту. Стійкість до засухи 8,0-8,6 балів, вилігання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 79,1-79,0 %. Вміст крохмалю 70,9-73,4 %, білку 9,1-9,9 %.

## ⑧ 07004038 ДМС Адаптер

Заявник:

Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Maic"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової пуски - слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довгага (від 151 до 200 см). Пластиинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня, за формою циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення пусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 74,4 ц/га, гарантована прибавка складає - 9,7 ц/га. Стійкість до засухи 7,5 балів, вилігання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 78,3 %. Вміст крохмалю 73,1 %, білку 9,6 %.

## ⑧ 07004040 Депозит МС

Заявник:

Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Maic"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - сильне, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довгага (від 151 до 200 см). Пластиинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення пусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 67,8 ц/га, гарантований приріст складає 8 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилігання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,4%. Вміст крохмалю відповідно - 72,8%, білка 10,1%.

## Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник:

Монсанто Інтернейшнл Сольрл

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення