

ранній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – сильне. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- сильна. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий.

Урожайність по зоні Степу 73,3 ц/га, гарантована прибавка 11,6 ц/га. Стійкість до засухи 7,7 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,2 %. Вміст крохмалю 72,7 %, білку 8,9 %.

### 06004108 ЕС Крістель

Заявник: Євраліс Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка.

Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – від слабкого до помірного. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- сильна. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня ( від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу - 79,3 ц/га, Полісся - 87,9 ц/га, гарантована прибавка відповідно 17,1- 1,9 ц/га. Стійкість до засухи 7,9-8,7 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,0-79,7%. Вміст крохмалю 72,3 %, білку 9,4 - 8,8 %.

### 07004026 ЕС Поттер

Заявник: Євраліс Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- відсутня або дуже слабка. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня ( від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 63,3 ц/га, гарантована прибавка складає 1,8 ц/га. Стійкість до засухи 6,7 балів, вилягання 8,8 балів, пухирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,2 %. Вміст крохмалю 73,9 %, білку 9,0 %.

### 07004111 ЕС Гарант

Заявник: Євраліс Семанс

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 %

## Степ, Полісся

## Степ

## Степ