

ранній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – сильне. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- сильна. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий.

Урожайність по зоні Степу 73,3 ц/га, гарантована прибавка 11,6 ц/га. Стійкість до засухи 7,7 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,2 %. Вміст крохмалю 72,7 %, білку 8,9 %.

06004108 ЕС Крістель

Заявник: Євраліс Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка.

Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – від слабкого до помірного. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- сильна. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу - 79,3 ц/га, Полісся - 87,9 ц/га, гарантована прибавка відповідно 17,1- 1,9 ц/га. Стійкість до засухи 7,9-8,7 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,0-79,7%. Вміст крохмалю 72,3 %, білку 9,4 - 8,8 %.

07004026 ЕС Поттер

Заявник: Євраліс Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті – слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- відсутня або дуже слабка. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 63,3 ц/га, гарантована прибавка складає 1,8 ц/га. Стійкість до засухи 6,7 балів, вилягання 8,8 балів, пухирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,2 %. Вміст крохмалю 73,9 %, білку 9,0 %.

07004111 ЕС Гарант

Заявник: Євраліс Семанс

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 %

Степ, Полісся

Степ

Степ

рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - від слабкої до помірної.

Урожайність по зоні Степу - 83,4 ц/га, гарантований приріст складає 16,8 ц/га. Стійкість до засухи - 8,4 бали, вилягання - 8,9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,1%. Вміст крохмалю відповідно - 71,8%, білка - 10,2%.

07004112 ЕС Сігма

Заявник: Євраліс Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - помірне. Форма верхівки першого листка - округла. Положення листкової пластинки у просторі - ледь похиле. Зигзагоподібність стебла - слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - помірне. Інтенсивність антоціанового забарвлення пиляків на середній третині головної осі волоті на щойно з'явлених пиляках - помірне. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок (за винятком основи) - слабка. Волоть нещільна. Час появи шовку на качані - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” - помірна. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - від короткого до середнього. Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів - середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - жовто-оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 87,7 ц/га, Лісостепу - 91,2 ц/га, Полісся - 88,7 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 25,5 ц/га, в зоні Лісостепу - на рівні стандартів, в зоні Полісся - 2,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,3-8,7 балів, вилягання 8,6-9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 83,4-79,8-75,9 %. Вміст крохмалю 71,4-72,7-71,6 %, білку 8,8-9,3-9,9 %.

07004113 ЕС Сенсор

Заявник: Євраліс Семанс

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - дуже сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу 87,3 ц/га, Лісостепу - 95,7 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 22,6 ц/га, в зоні Лісостепу - 7,1 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 81,6-80,2 %. Вміст крохмалю 74,7-73,6 %, білку 8,9-9,9 %.

07004114 ЕС Марко

Заявник: Євраліс Семанс

Степ