

рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - від слабкої до помірної.

Урожайність по зоні Степу - 83,4 ц/га, гарантований приріст складає 16,8 ц/га. Стійкість до засухи - 8,4 бали, вилягання - 8,9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,1%. Вміст крохмалю відповідно - 71,8%, білка - 10,2%.

07004112 ЕС Сігма

Заявник: Євраліс Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - помірне. Форма верхівки першого листка - округла. Положення листкової пластинки у просторі - ледь похиле. Зигзагоподібність стебла - слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - помірне. Інтенсивність антоціанового забарвлення пиляків на середній третині головної осі волоті на щойно з'явлених пиляках - помірне. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок (за винятком основи) - слабка. Волоть нещільна. Час появи шовку на качані - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” - помірна. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - дуже довга (понад 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - від короткого до середнього. Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів - середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини - жовтий, низу зернини - жовто-оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 87,7 ц/га, Лісостепу - 91,2 ц/га, Полісся - 88,7 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 25,5 ц/га, в зоні Лісостепу - на рівні стандартів, в зоні Полісся - 2,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,3-8,7 балів, вилягання 8,6-9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 83,4-79,8-75,9 %. Вміст крохмалю 71,4-72,7-71,6 %, білку 8,8-9,3-9,9 %.

07004113 ЕС Сенсор

Заявник: Євраліс Семанс

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - дуже сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу 87,3 ц/га, Лісостепу - 95,7 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 22,6 ц/га, в зоні Лісостепу - 7,1 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 81,6-80,2 %. Вміст крохмалю 74,7-73,6 %, білку 8,9-9,9 %.

07004114 ЕС Марко

Заявник: Євраліс Семанс

Степ