

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

Заявка № 18118001 Назва сорту: Ісіс **Заявник (код):** 2469 **Власник сорту (код):** 2469

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.02.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190822

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Листкова розетка: за шириною основи	середня	5	
5	Листок: положення у просторі	напівпряме	3	
6	Листок: за довжиною	середній	5	
7	Листкова пластинка: форма	широкооберненояцеподібна	5	
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2	
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	відсутній	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	середня	5	
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9	
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	помірні	5	
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5	
15	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
17	Коренеплід: діаметр	середній	5	
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	вузький	3	
19	Коренеплід: форма	еліптична	3	
20	Коренеплід: форма верхівки	увігнута	1	
21	Коренеплід: форма основи	округла	4	
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1	
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3	
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині кіноварі)	яскраво-червоне (забарвлення	1	
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0	
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3	
27	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	напівпрозорі білі	1	
28	Час досягання	ранній	3	
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	відсутня або дуже слабка	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 95. Тривалість періоду до досягання, діб – 24. Середня маса плоду, г – 25. Вміст сухої речовини, % – 10,5; вітаміну С, мг% – 21. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла (*Sclerotinia libertiana* Fuck.), гниль мокра (*Erwinia carotovora* (Jon.) Hell. та *Erwinia aroidea* (Town.) Holl.), чорна ніжка (*Pythium debaryanum* Hesse; *Rhizoctonia aderholdii* (Ruhl.) Kolosch.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.