

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.

Заявка № 20006002 Назва сорту: МІП Перлина Заявник (код): 1589 Власник сорту (код): 2859

Володілець патенту (код): 2859

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.11.2024 Патент № 240488

Дата пріоритету: 04.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 01.11.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240646

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Колеоптиль: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 2 | Перший листок: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 3 | Рослина: габітус | напівпрямий | 3 | |
| 4 | Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком | велика | 7 | |
| 5 | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | ранній | 3 | |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | сильний | 7 | |
| 7 | Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку) | помірний | 5 | |
| 8 | Остюки: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 9 | Соломина: опущення верхнього вузла | помірне | 5 | |
| 10 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | сильний | 7 | |
| 11 | Колос: восковий наліт | дуже сильний | 9 | |
| 12 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | низыка | 3 | |
| 13 | Колос: наявність і розміщення остюків | по всій довжині колоса | 4 | |
| 14 | Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса | довша | 3 | |
| 15 | Нижня колоскова луска: за формою | яйцеподібна | 3 | |
| 16 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою | піднесене | 4 | |
| 17 | Нижня колоскова луска. Плече: за ширину | середнє | 5 | |
| 18 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною | середній | 5 | |
| 19 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою | ледь зігнутий | 2 | |
| 20 | Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні | відсутнє | 1 | |
| 21 | Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом) | помірне | 5 | |
| 22 | Остюки: забарвлення | світло-коричневе | 2 | |
| 23 | Колос: за довжиною (без остюків) | середній | 5 | |
| 24 | Колос: опущення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 25 | Колос: інтенсивність забарвлення за досягнання | слабко забарвлене | 2 | |
| 26 | Колос: форма | піраміdalna | 1 | |
| 27 | Колос: за щільністю | щільний | 7 | |
| 28 | Зернівка: форма | видовжена | 7 | |
| 29 | Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки) | середній | 5 | |
| 30 | Зернівка: забарвлення у фенолі | свіtle | 3 | |
| 31 | Тип розвитку | ярий | 3 | |
| 32 | Колос: забарвлення | червоне | 2 | |
| 33 | Язичок: за формою | округлий | 1 | |
| 34 | Язичок: за довжиною | середній | 5 | |
| 35 | Вушка: охоплення соломини | неповне | 1 | |
| 36 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | слабке | 3 | |
| 37 | Лиші для сортів пшениці двоверної. Колос: ламкість | ознака не визначається | 0 | |
| 38 | Лиші для сортів пшениці двоверної. Зернівка: маса 1000 | ознака не визначається | 0 | |
| 39 | Лиші для сортів пшениці двоверної. Рослина: час досягнання зерна | ознака не визначається | 0 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|------|---|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 2,19 | 3,63 | |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | 3,22 | 5,10 | |
| +,- до усередненої урожайності, т/га | 1,03 | 1,47 | |
| +,- до усередненої урожайності, % | 47,0 | 40,5 | |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,16 | 0,20 | |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 89 | 94 | |
| Висота рослини, см | 79,9 | 86,3 | |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г | 44,5 | 49 | |
| Вміст білка, % | 15,4 | 14,2 | |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 7 | |
| Стійкість до обсипання, бал | 9 | 9 | |
| Стійкість до посухи, бал | 8 | 7 | |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал | 9 | 9 | |
| Стійкість проти бурої іржі, бал | 9 | 9 | |
| Стійкість проти фузаріозу колоса, бал | 9 | 9 | |
| Стійкість проти мухи шведської, бал | 9 | 9 | |
| Стійкість проти клопа-черепашки, бал | 7 | 9 | |
| Стійкість проти твердої сажки, бал | 9 | 9 | |
| Стійкість проти летючої сажки, бал | 9 | 9 | |
| Напрям використання | x | x | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.