

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045032 Назва сорту: Байрактар **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Дата пріоритету: 14.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.11.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240709

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насіння: розмір	середній	5	
14	Насіння: форма	видовжена	3	
15	Насіння: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насіння: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насіння: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насіння: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час достигання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,20	3,25	3,06
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,69	3,09	3,36
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,51	-0,16	0,30
+, - до усередненої урожайності, %	-23,2	-4,9	9,8
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,06	0,06
Тривалість періоду вегетації, днів	120	119	122
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	169,1	171,9	182,1
Висота рослини, см	60,4	77,3	81,7
Висота прикріплення нижнього бобу, см	13	10,8	12,8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	6	9	8
Стійкість до посухи, бал	5	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	9
Вміст білка, %	40,9	39,8	39,5
Вміст олії, %	21,5	22	22,4
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.