

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 23045001 Назва сорту:** П007А12 **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 28.11.2024

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 240767**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	темно-коричневе	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжена	3	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	помірна	2	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,03	3,13	3,03
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,11	3,35	3,66
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,08	0,22	0,63
+, - до усередненої урожайності, %	3,9	7,0	20,8
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,08	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	108	113	118
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	173,3	174	191,1
Висота рослини, см	63,1	73,5	83,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,1	11,6	12
Стійкість до вилягання, бал	9	9	6
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	9
Стійкість до посухи, бал	6	7	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	9
Вміст білка, %	39,1	38,5	37,4
Вміст олії, %	21,4	21,9	22,5
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл,вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.