

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045007 Назва сорту: П11А67 **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.11.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240766

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гілокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гілокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдтермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від напівпрямого до горизонтального	4	
5	Рослина: забарвлення опушенні головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насініна: розмір	середній	5	
14	Насініна: форма	кулясто-плескаті	2	
15	Насініна: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насініна: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насініна: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насініна: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягнення	середній	5	
21	Біб: інтенсивність строго забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянсуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,20	3,25	3,06
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,73	3,59	3,66
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,47	0,34	0,60
+,- до усередненої урожайності, %	21,4	10,5	19,6
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,06	0,06
Тривалість періоду вегетації, діб	121	123	126
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	168	183,3	189,8
Висота рослини, см	65,2	83,8	89,3
Висота прикрілення нижнього бобу, см	13,1	12,8	13,7
Стійкість до виллягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	6	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	7
Вміст білка, %	38,2	39,3	37,2
Вміст олії, %	22	22,3	22,8
Блок (Група стигlosti)	7	7	7
Напрям використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбл, сл	сбл, вл	сбл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.